

I. BÖLÜM

TEMEL KAVRAMLAR

Diferansiyel Denklemler: Bir diferansiyel denklemler, bir bilinmeyen fonksiyonu ve türevlerini içeren bir denklemdir.
Örneğin, aşağıdaki y bilinmeyen fonksiyonunu içeren dif. denklemlerdir:

$$\frac{dy}{dx} = 5x + 3 \quad (1.1)$$

$$e^y \frac{d^2y}{dx^2} + 2 \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = 1 \quad (1.2)$$

$$4 \frac{d^3y}{dx^3} + (\sin x) \cdot \frac{d^2y}{dx^2} + 5xy = 0 \quad (1.3)$$

$$\left(\frac{d^2y}{dx^2} \right)^3 + 3y \left(\frac{dy}{dx} \right)^7 + y^3 \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = 5x \quad (1.4)$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - 4 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0 \quad (1.5)$$

Eğer bilinmeyen fonksiyon sadece bir bağımsız değişkene bağlı ise dif. denklemler bir Adi diferansiyel denklemdir. Eğer iki veya daha fazla bağımsız değişkene bağlı ise dif. denklemler bir Kısmi diferansiyel denklemdir. Bunu göre (1.1) - (1.4) denklemleri adi, (1.5) denklemleri kısmi dif. denklemlerdir.

Bir dif. denklemin mertebesi, denklemlerde bulunan en yüksek türevin mertebesidir.

(1.1) denklemleri birinci mertebeden bir dif. denklemdir.
(1.2), (1.4) ve (1.5) denklemleri ikinci mert. dif. denklemlerdir.
(1.3) denklemleri üçüncü mertebeden dif. denklemdir.

2
Gösterim: $y', y'', y''', y^{(4)}, \dots, y^{(n)}$ ifadeleri genellikle y nin ilgili bağımlı değişkene göre, birinci, ikinci, üçüncü, ..., n -yüncü türevlerini gösterir. Böylece eğer bağımlı değişken x ise, $y'' = \frac{d^2 y}{dx^2}$, eğer p ise $y'' = \frac{d^2 y}{dp^2}$ şeklinde olur. Eğer bağımlı değişken t ise genellikle $\dot{y}, \ddot{y}, \dddot{y}, \dots$ sembolleri sırasıyla $\frac{dy}{dt}, \frac{d^2 y}{dt^2}, \frac{d^3 y}{dt^3}, \dots$ türevlerini gösterir.

Gözlemler: y bilinmeyen fonksiyonunun ve x bağımlı değişkeninin bir dif. denkleminin I aralığı üzerinde bir çözümü, I dalı her x için dif. denlemi özdeş olarak sağlayan bir $y(x)$ fonksiyonudur.

Örnek: c_1 ve c_2 keyfi sabitler olmak üzere,
 $y(x) = c_1 \sin 2x + c_2 \cos 2x$ fonksiyonunun $y'' + 4y = 0$ denkleminin bir çözümü olup olmadığını inceleyelim:

$$y' = 2c_1 \cos 2x - 2c_2 \sin 2x$$

$$y'' = -4c_1 \sin 2x - 4c_2 \cos 2x$$

$$\begin{aligned} y'' + 4y &= (-4c_1 \sin 2x - 4c_2 \cos 2x) + 4(c_1 \sin 2x + c_2 \cos 2x) \\ &= (-4c_1 + 4c_1) \sin 2x + (-4c_2 + 4c_2) \cos 2x \\ &= 0 \end{aligned}$$

olar. O halde $y = c_1 \sin 2x + c_2 \cos 2x$ fonksiyonu tüm x değerleri için verilen diferansiyel denklemin sağları.

③

Başlangıç - Deger ve Sınır Deger Problemleri :

Bir diferensiyel denklem ve bölünmeyen fonk. ve türevleri üzerinde tanımlı bağımsız değişkenin aynı değerinde verilen koşullar, birlikte bir bağımsız deger problemi oluşturur. Eğer yardımcı koşullar bağımsız değişkenin birden fazla değerinde verilirse problem bir sınır-deger problemi olur.

Örneğin, $y'' + 2y' = e^x$, $y(\pi) = 1$, $y'(\pi) = 2$ bir başlangıç deger problemidir.

$y'' + 2y' = e^x$, $y(0) = 1$, $y'(1) = 1$ bir sınır-deger problemidir.

2. BÖLÜM

BİRİNCİ MERTEBEDEN ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

2.1. TAM DİFERENSİYEL DENKLEMLER

Birinci mertebeden bir adi lineer dif. denklem,

$$G(x, y, y') = 0 \quad \text{veya} \quad \frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

şeklinde yazıldığı gibi

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad \dots \dots \dots (2.1)$$

şeklinde de yazılabilir. Eğer varsa, bu dif. denklemin çözümünün

$$f(x, y) = C$$

şeklinde bir kapalı fonksiyon olması gerekir.

Pamuk Testi : Eğer $M(x, y)$ ve $N(x, y)$ sürekli fonksiyonlarsa ve x, y - düzleminde bir dörtgen bölge

(4)

üzerinde sürekli birinci kısımlı türevleri varsa, ayrıca

$$\frac{\partial M(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial N(x,y)}{\partial x}$$

ezitliği sağlanıyorsa (2.1) dif. denklemleri tam dif. denklemdir.

Gözlem Metodu : Bir $F(x,y) = C$ fonksiyonunun tam diferensiyeli

$$dF(x,y) = \frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy = 0$$

şeklinde yazıldığından

$$M(x,y) = \frac{\partial F}{\partial x} \quad \text{ve} \quad N(x,y) = \frac{\partial F}{\partial y}$$

olur. $\frac{\partial F}{\partial x} = M(x,y)$ eşitliğinde her iki tarafın x 'e göre kısmi integrali alınır

$$F(x,y) = \int M(x,y) dx + \phi(y) \quad \dots \dots \dots (2.2)$$

elde edilir. Burada $\phi(y)$ integrasyon sabitidir.

Şimdi de y 'ye göre kısmi türev alınır,

$$\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left[\int M(x,y) dx \right] + \frac{d\phi}{dy}$$

bulunur. Diğer taraftan $\frac{\partial F}{\partial y} = N(x,y)$ olduğundan bu değer sağ denkleminde yerine yazılırsa

$$N(x,y) = \frac{\partial}{\partial y} \left[\int M(x,y) dx \right] + \frac{d\phi}{dy}$$

bulunur. Gereksinli hesaplamalar yapıldırsa

$$\frac{d\phi}{dy} = \varphi(y) \quad \dots \dots \dots (2.3)$$

olur. (2.3) eşitliğinde y 'ye göre integral alınır ve $\phi(y)$ fonksiyonu bulunur. $\phi(y)$ nin bulunan değeri

(2.2) denkleminde yerine yazılırsa verilen dif. denklemin $F(x,y) = C$ genel çözümü bulunup olur. ⑤

ÖRNEK: $(2x + e^y)dx + \underbrace{xe^y}_N dy = 0$ dif. denklemini çözünüz.
Çözüm: Öncelikle denklemin Tam dif. denklemin (TDD) olup olmadığına bakalım.

$$M(x,y) = 2x + e^y, \quad N(x,y) = xe^y \text{ dir.}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} (2x + e^y) = e^y \\ \frac{\partial N}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} (xe^y) = e^y \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \text{ olduğundan}$$

verilen denklemin TDD'dir.

Bu nedenle $F(x,y) = C$ şeklinde bir genel çözümü vardır. Şimdi amacımız bu $F(x,y)$ fonksiyonunu bulmaktır.
 $\frac{\partial F}{\partial x} = M(x,y) = 2x + e^y$ eşitliğinde x 'e göre integral alınır,

$$F(x,y) = \int (2x + e^y) dx + \phi(y)$$

$\Rightarrow F(x,y) = x^2 + xe^y + \phi(y) \dots \dots \dots (*)$
 olur. Burada $\phi(y)$ integrasyon sabitinin değerini bulmamız gerekir. $(*)$ eşitliğinde y 'ye göre kısmi türev alınır

$$\frac{\partial F}{\partial y} = xe^y + \frac{d\phi}{dy} \dots \dots \dots (**)$$

olur. Diğer taraftan

$$\frac{\partial F}{\partial y} = N(x,y) = xe^y$$

olduğundan, bu değer $(*)$ 'da yerine yazılırsa

⑥

$$xe^y = xe^y + \frac{d\phi}{dy} \Rightarrow \frac{d\phi}{dy} = 0 \Rightarrow \phi(y) = C_0$$

bulunur. $\phi(y)$ nin bu değeri $\otimes$ denkleminde yerine yerleştirilirse

$$F(x,y) = x^2 + xe^y + C_0 = C_1$$

elde edilir. $C = C_1 - C_0$ alınırda soruda verilen dif.

denklemin çözümü ailesi

$$\boxed{x^2 + xe^y = C}$$

olar. Buradan C nin her değeri için dif. denklemin bir özel çözümü bulunur.

ÖRNEK: $\underbrace{3x(xy-2)}_M dx + \underbrace{(x^3+2y)}_N dy = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm: $M = 3x(xy-2)$ ve $N = x^3+2y$ verilmiştir.

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 3x^2 \text{ ve } \frac{\partial N}{\partial x} = 3x^2 \text{ olup } \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

olduğundan verilen denklemin bir TDD'dir.

$$\frac{\partial F}{\partial x} = M = 3x(xy-2)$$

eziliğinde her iki tarafın x 'e göre integrali alınırda

$$F(x,y) = \int 3x(xy-2)dx + \phi(y)$$

$$\Rightarrow F(x,y) = x^3y - 3x^2 + \phi(y) \dots \dots \dots \otimes$$

olar. Şimdi de her iki tarafın y 'ye göre türevi alınırda

$$\frac{\partial F}{\partial y} = x^3 + \frac{d\phi}{dy} \dots \dots \dots \otimes \otimes$$

olar. Diğer taraftan $\frac{\partial F}{\partial y} = N$ olduğundan bu değer $\otimes \otimes$ da yerine yazılırda

(7)

$$\cancel{x^3 + 2y} = \cancel{x^3} + \frac{d\phi}{dy} \Rightarrow \frac{d\phi}{dy} = 2y \Rightarrow \phi(y) = y^2 + c_0$$

bulunur. $\phi(y)$ nin bu değeri $\otimes$ 'da yerine yazılırsa

$$F(x,y) = x^3y - 3x^2 + y^2 + c_0 = c_1 \quad (c = c_1 - c_0)$$

$$\Rightarrow x^3y - 3x^2 + y^2 = c$$

genel çözümü bulunur.

ÖRNEK: $(y \cos x + 2xe^y) dx + (\sin x + x^2e^y + 2) dy = 0$
denklemini çözümlü.

Çözüm: $M = y \cos x + 2xe^y$ ve $N = \sin x + x^2e^y + 2$ dir.

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \cos x + 2xe^y \quad \text{ve} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \cos x + 2xe^y$$

old. $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ dir. O halde denklemin TDD'dir.

$$\frac{\partial F}{\partial x} = M = y \cos x + 2xe^y$$

$$\Rightarrow F(x,y) = \int (y \cos x + 2xe^y) dx + \phi(y)$$

$$F(x,y) = y \sin x + x^2e^y + \phi(y) \quad \dots \quad (*)$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = \sin x + x^2e^y + \frac{d\phi}{dy} \quad \dots \quad (**)$$

$\frac{\partial F}{\partial y} = N$ değeri $\otimes$ 'da yerine yazılırsa

$$\cancel{\sin x + x^2e^y} + 2 = \cancel{\sin x + x^2e^y} + \frac{d\phi}{dy} \Rightarrow \frac{d\phi}{dy} = 2 \Rightarrow \phi = 2y + c_0$$

$\phi(y)$ nin değeri $\otimes$ 'da yerine yazılırsa

$$F(x,y) = y \sin x + x^2e^y + 2y + c_0 = c_1$$

$\Rightarrow y \sin x + x^2e^y + 2y = c$
genel çözümü bulunur.

2.2. İNTEGRASYON ÇARPANI :

Eğer (2.1) denklemi Tam dif. denklemler değilde başka metotlar kullanılır. Bunlardan biri, eğer varsa, dif. denklemin integrasyon çarpasını bulmaktır. Buna göre eğer (2.1) denklemi bir $\mu(x,y)$ fonksiyonu ile çarpıldığında tam dif. denklemler olurdu $\mu(x,y)$ 'ye integrasyon çarpısı denir.

Tam dif. denklemler alınıyan bir dif. denklemler

$$Mdx + Ndy = 0 \quad (2.4)$$

olsun. Bu denklemin bir integrasyon çarpısı μ ise

$$\mu Mdx + \mu Ndy = 0 \quad (2.5)$$

denklemi bir PDD olur. Bu durumda (2.4) ile (2.5)'in genel çözümleri aynı olur.

Eğer

$$f(x) \equiv \frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right)$$

sadece x 'e bağlı bir fonksiyon ise o zaman

$$\mu(x) = e^{\int f(x)dx}$$

elde edilir.

Eğer

$$g(y) \equiv \frac{1}{M} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right)$$

sadece y 'ye bağlı bir fonksiyon ise o zaman

$$\mu(y) = e^{\int g(y)dy}$$

bulunur.

9

ÖRNEK: $(x-y)dx - dy = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm: Burada $M = x-y$ ve $N = -1$ dir.

$\frac{\partial M}{\partial y} = -1$ ve $\frac{\partial N}{\partial x} = 0$ olup $-1 \neq 0$ old. TDD değildir.

μ integron çarpanı bulmayı kullanalım:

$$f(x) = \frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) = \frac{1}{-1} (-1-0) = 1$$

bulunur. Buradan $f(x)$ in sadece x 'e bağlı olduğu söylenebilir.

$$\mu(x) = e^{\int f(x) dx} = e^{\int 1 \cdot dx} = e^x$$

old. integron çarpanı $\mu = e^x$ dir. Verilen dif. denklemin bütün terimleri e^x ile çarpılarak

$$e^x (x-y) dx - e^x dy = 0$$

elde edilir. Bu ise bir TDD dir. Şimdi bu denklemin önceden bildiğimiz yolu çözelim. Yani $F(x,y)$ çözümleri bulalım.

$$\frac{\partial F}{\partial x} = M' = e^x (x-y)$$

$$\Rightarrow \int e^x (x-y) dx = \int e^x (x-y) dx + \phi(y)$$

$$\Rightarrow \int e^x (x-y) dx = x e^x - e^x - y e^x + \phi(y) \dots (*)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial F}{\partial y} = -e^x + \frac{d\phi}{dy}$$

bulunur. Diğer taraftan $\frac{\partial F}{\partial y} = N' = -e^x$ olduğundan

$$-e^x = -e^x + \frac{d\phi}{dy} \Rightarrow \frac{d\phi}{dy} = 0 \Rightarrow \phi(y) = C_0$$

olup $(*)$ da yerine yazarsak

$$F(x,y) = x e^x - e^x - y e^x + C_0 = C_1$$

$$\boxed{x e^x - e^x - y e^x = C}$$

bulunur.

ÖRNEK : $y dx + (3 + 3x - y) dy = 0$ denklemini çözünüz. (10)

Görüş : Denklem TDD değildir. İntegrasyon şartını bulalım:

$$f(x) \equiv \frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) = \frac{1}{3+3x-y} (1-3)$$

fonksiyonu sadece x'e bağlı olmayıp y'ye de bağlıdır. Şimdi de sadece y'ye bağlı olup olmadığını kontrol edelim.

$$g(y) \equiv \frac{1}{N} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) = \frac{1}{y} (3-1) = \frac{2}{y}$$

fonksiyonu sadece y'ye bağlı olduğundan int. şartını

$$\mu(y) = e^{\int g(y) dy} = e^{\int \frac{2}{y} dy} = e^{2 \ln y} = e^{\ln y^2} = y^2$$

bulunur. Soruda verilen denklemin tüm terimleri y^2 ile çarpılrsa,

$$y^3 dx + y^2 (3 + 3x - y) dy = 0$$

olur. Bu denklem TDD'dir.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M' = y^3$$

$$\Rightarrow f(x, y) = \int y^3 dx + \phi(y)$$

$$f(x, y) = xy^3 + \phi(y)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y} = 3xy^2 + \frac{d\phi}{dy}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = N' = y^2 (3 + 3x - y) \text{ olduğundan}$$

$$y^2 (3 + 3x - y) = 3xy^2 + \frac{d\phi}{dy} \Rightarrow \frac{d\phi}{dy} = 3y^2 - y^3$$

$$\Rightarrow \phi(y) = y^3 - \frac{y^4}{4} + C_0$$

$$\Rightarrow f(x, y) = xy^3 + y^3 - \frac{y^4}{4} + C_0 = C_1$$

$$\boxed{xy^3 + y^3 - \frac{y^4}{4} = C}$$

genel çözümü bulunur.

(11)

Not: Yaygın integrasyon çarpanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Terimler	İntegrasyon Çarpanları
$y dx - x dy$	$-\frac{1}{x^2}, \frac{1}{y^2}, -\frac{1}{xy}, -\frac{1}{x^2+y^2}$
$y dx + x dy$	$\frac{1}{xy}, \frac{1}{x^2+y^2}, \frac{1}{(xy)^n}, n > 1, n \in \mathbb{N}$

ÖRNEK: $x dy - y dx = 0$ denklemini gözünüz.

Çözüm: Bu denklemin bir PDD değildir. Tablodaki 1. denkleme uygun olduğu için $\mu = \frac{1}{x^2}$ bir integrasyon çarpanı

olarak alınabilir. Verilen denklemin $\frac{1}{x^2}$ ile çarpılarak

$$\underbrace{\frac{y}{x}}_{\text{y'nin türevi}} \cdot \frac{x dy - y dx}{x^2} = 0 \Rightarrow \frac{d\left(\frac{y}{x}\right)}{\frac{y}{x}} = 0 \Rightarrow \frac{y}{x} = C \Rightarrow \boxed{y = Cx}$$

Yukarıda verilen dif. denklemin için $-\frac{1}{y^2}$ ve $\frac{1}{xy}$ formasyonları da birer integrasyon çarpanlarıdır. Bu durumda

$$-\frac{x dy - y dx}{y^2} = d\left(\frac{x}{y}\right) = 0 \Rightarrow \dots \boxed{y = Cx}$$

olar, diğer taraftan $\frac{1}{xy}$ int. çarpanı ile

$$\frac{x dy - y dx}{xy} = \frac{dy}{y} - \frac{dx}{x} = 0$$

$$\Rightarrow \ln y - \ln x = \ln C$$

$$\Rightarrow \ln \frac{y}{x} = \ln C \Rightarrow \frac{y}{x} = C \Rightarrow \boxed{y = Cx}$$

(12)

ÖRNEK: $(3x^2 - y)dx + xdy = 0$ denklemini gözünüz.

Çözüm: Verilen denklemin yeniden yazılması:

$$3x^2 dx + \underbrace{xdy - ydx}_{d(xy)} = 0$$

denklemin tablodaki 1. denklemin eklenmesi olduğundan $\frac{1}{x^2}$ ile çarparsak

$$3dx + \frac{xdy - ydx}{x^2} = 0$$

$$\Rightarrow 3dx + d\left(\frac{y}{x}\right) = 0 \xrightarrow{\text{integral}} 3x + \frac{y}{x} = C \text{ bulunur.}$$

ÖRNEK: $(y - xy^2)dx + (x + x^2y^2)dy = 0$ denklemini gözünüz.

Çözüm: TDD değildir. Ayrıca $\frac{1}{n} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right)$ ve $\frac{1}{n} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right)$ ifadeleri sadece x 'e ve y 'ye bağlı değildir. 0 halde verilen diff. denklemin yeniden düzenlenirse

$$(ydx + xdy) + (-xy^2dx + x^2y^2dy) = 0$$

olur. Bu denklemin soldaki parçası tablodaki 2. denkleme aynı olduğundan integrasyon çarpanı $\mu = \frac{1}{(xy)^2}$ alınır ve

bu denklemin tüm terimleri $\frac{1}{(xy)^2}$ ile çarpılırsa

$$\frac{ydx + xdy}{(xy)^2} + \frac{-xy^2dx + x^2y^2dy}{(xy)^2} = 0$$

$\mu = \frac{1}{(xy)^2}$ seçilirse
dx'in önündeki y^2
dy'nin " x^2
gideceğimizin integral alınabilecektir.

$$\begin{aligned} \left(\int \frac{du}{u^2} = -\frac{1}{u} \right) &\Rightarrow \int \frac{ydx + xdy}{(xy)^2} = \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{dy}{y} \\ &\Rightarrow -\frac{1}{xy} = \ln|x| - y + C \end{aligned}$$

Kapalı çözümü bulunur.

ÖRNEK : $y dx + (x - yx^2) dy = 0$ denklemini çözünüz. (13)

Çözüm : $y dx + x dy - x^2 y dy = 0$

denkleminin her iki tarafı $\frac{1}{(xy)^2}$ ile çarpılırsa

$$\frac{y dx + x dy}{(xy)^2} - \frac{dy}{y} = 0 \Rightarrow \frac{d(xy)}{(xy)^2} - \frac{dy}{y} = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{xy} - \ln y = C$$

Not:1 $d(xy)$ ifadesi (xy) nin diferensiyeli denektir.

$$d(xy) = 1 \cdot dx \cdot y + 1 \cdot dy \cdot x = y dx + x dy$$

Not:2 Eger $\frac{1}{xy}$ ile çarpılırsa dy nin önündeki x gitmiyor.

Amaç dx 'in önündeki fonksiyon sadece x 'e, dy nin önündeki de sadece y 'ye bağlı olmalıdır ve böylece integral alınabilir.

2.3. DEĞİŞKENLERİNE AYRILABİLEN DİFERENSİYEL DENKLEMLER

Eger bir dif. denklem,

$$A(x)dx + B(y)dy = 0 \text{ veya } \frac{dy}{dx} = \frac{f(x)}{g(y)}$$

şeklinde yazılabilirse bu denkleme değişkenlerine ayrılabilen diferensiyel denklemler denir. Bu şekilde yazılabilen denklemler çözümlenir.

ÖRNEK : $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$ denklemini çözünüz.

Çözüm : $x dx + y dy = 0 \Rightarrow \int x dx + \int y dy = C_1$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} = C_1 \Rightarrow \boxed{x^2 + y^2 = C}$$

(14)

ÖRNEK: $y dx - x dy = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm: $\frac{dx}{x} - \frac{dy}{y} = 0 \Rightarrow \ln x - \ln y = \ln C_0$
 $\Rightarrow \ln \frac{x}{y} = \ln C_0 \Rightarrow \frac{x}{y} = C_0 \Rightarrow y = \frac{1}{C_0} x \Rightarrow \boxed{y = Cx}$

ÖRNEK: $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y(1-x^2)^{\frac{1}{2}}}$ denklemini çözünüz

Çözüm: $y dy - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = 0$ denkleminde integral alınırsa

$$\frac{1}{2} y^2 + \sqrt{1-x^2} = C_0 \Rightarrow y^2 + 2\sqrt{1-x^2} = C \text{ bulunur.}$$

ÖRNEK: $(3x+8)(y^2+4) dx - 4y(x^2+5x+6) dy = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm: $\frac{3x+8}{x^2+5x+6} dx - \frac{4y}{y^2+4} dy = 0$

$$\Rightarrow \frac{3x+8}{(x+2)(x+3)} dx - \frac{4y}{y^2+4} dy = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{2}{x+2} + \frac{1}{x+3} \right) dx - 2 \cdot \frac{2y}{y^2+4} dy = 0$$

$$\Rightarrow 2 \ln|x+2| + \ln|x+3| - 2 \ln(y^2+4) = \ln C$$

$$\Rightarrow (x+2)^2 \cdot (x+3) = C \cdot (y^2+4)^2$$

bulunur.

Not: $\int \frac{3x+8}{(x+2)(x+3)} dx = \int \left(\frac{A}{x+2} + \frac{B}{x+3} \right) dx \Rightarrow A=2, B=1$ bulunur.
 (Basit kesirlere ayırma)

2.4. HOMOJEN DİFERENSİYEL DENKLEMLER

(15)

Birinci mertebeden bir lineer adi dif. denklemin

$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ şeklinde verildiğini biliyoruz. Eğer $\frac{y}{x}$ veya

$$\frac{x}{y} \text{ nin } \frac{dy}{dx} = f(x, y) = g\left(\frac{y}{x}\right) \dots \dots \dots (2.6)$$

şeklinde bir g fonksiyonu bulunabilirse o zaman $f(x, y)$ fonksiyonuna homojen fonksiyon ve yukarıdaki denkleme de homojen dif. denklemleri denir.

Eğer bir $F(x, y)$ fonksiyonunda x yerine tx ve y yerine ty yazıldığında fonksiyon

$$F(tx, ty) = t^n F(x, y)$$

şeklinde yazılabilirse, bu fonksiyona n -inci dereceden homojen fonksiyon denir.

Bir homojen dif. denklemin, $v = \frac{y}{x}$ dönüşümü yapılarak değişkenlere ayrılabilen bir şekle döndürülür. Bu durumda

$$\frac{dy}{dx} = v + x \cdot \frac{dv}{dx}$$

dir. (2.6) nin çözümü, dif. denklemin

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{f(x, y)} \dots \dots \dots (2.7)$$

halinde yeniden yazarak ve $x = yu$ ($u = \frac{x}{y}$) dönüşümünü ve ilgili

$$\frac{dx}{dy} = u + y \frac{du}{dy}$$

türevini (2.7) denkleminde kullanarak da elde edilir.

Not: Homojen dif. denklemlerde integreasyon sonucu $\mu = \frac{1}{mx+ny}$ dir

ÖRNEK : $(x^2 + y^2) dx - xy dy = 0$ denklemini çözünüz. (16)

Çözüm : $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{xy} = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$

şeklinde yazılabildiği için verilen denklem homojendir.

$y = vx$ dönüşümü yapılırsa $v = \frac{y}{x}$ olduğundan

$$v + x \frac{dv}{dx} = v + \frac{1}{v} \Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{1}{v}$$

$$\Rightarrow v dv - \frac{dx}{x} = 0 \Rightarrow \frac{v^2}{2} - \ln x = C_0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{y}{x} \right)^2 - \ln x = C_0 \Rightarrow y^2 = x^2 \ln x^2 + C x^2$$

ÖRNEK : $(3x^2 - y^2) dx - 2xy dy = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm : $\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2 - y^2}{2xy} = \frac{3}{2} \frac{x}{y} - \frac{1}{2} \frac{y}{x}$, $y = vx$ alınırsa

$$\Rightarrow v + x \frac{dv}{dx} = \frac{3}{2v} - \frac{1}{2} v$$

$$\Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{v} - v \right)$$

$$\Rightarrow \frac{3dx}{x} = \frac{2v dv}{1 - v^2}$$

$$\Rightarrow \frac{3dx}{x} + \frac{2v dv}{v^2 - 1} = 0$$

$$\Rightarrow 3 \ln x + \ln(v^2 - 1) = \ln C$$

$$\Rightarrow \ln x^3 (v^2 - 1) = \ln C$$

$$\Rightarrow x^3 (v^2 - 1) = \ln C$$

$$\Rightarrow x^3 \left(\left(\frac{y}{x} \right)^2 - 1 \right) = \ln C \Rightarrow x(y^2 - x^2) = C$$

(17)

ÖRNEK: $(y-x)dx + (x+y)dy = 0$ denklemini çözümlü.

Çözüm: $\frac{dy}{dx} = \frac{x-y}{x+y} = \frac{\frac{x-y}{x}}{\frac{x+y}{x}} = \frac{1 - \frac{y}{x}}{1 + \frac{y}{x}}$

şeklinde yazılabildiği isim verilen dif. denklemin homojendir. $y = vx$ dönüşümü yapılırsa $v = \frac{y}{x}$ olduğundan

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{1-v}{1+v} \Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{1-2v-v^2}{1+v}$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{x} + \frac{(1+v)dv}{v^2+2v-1} = 0$$

$$\Rightarrow \ln x + \frac{1}{2} \ln(v^2+2v-1) = \ln C$$

$$\Rightarrow x^2 - 2xy - y^2 = C$$

ÖRNEK: $(y + \sqrt{x^2 + y^2})dx - xdy = 0$, $y(1) = 0$ başlangıç-değer problemini çözümlü.

Çözüm: $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} = \frac{y}{x} + \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{x^2}} = \frac{y}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}$

old. denklemin homojendir. $y = vx$ dönüşümü yapılırsa

$$v + x \frac{dv}{dx} = v + \sqrt{1+v^2} \Rightarrow \frac{dv}{dx} - \frac{dv}{\sqrt{1+v^2}} = 0$$

$$\Rightarrow \ln x - \ln(v + \sqrt{1+v^2}) = \ln C_1$$

$$\Rightarrow \ln x - \ln\left(\frac{y}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}\right) = \ln C_1$$

$$\Rightarrow y + \sqrt{x^2 + y^2} = Cx^2 \text{ bulunur.}$$

$$\Rightarrow \text{için } C=1 \text{ olduğundan çözümlü}$$

$$x=1 \text{ ve } y=0$$

$$y + \sqrt{x^2 + y^2} = x^2$$

şeklinde dir.

ÖRNEK: $y' = \frac{2y^4 + x^4}{xy^3}$ denklemini çözümlü.

(18) $\frac{2y^4 + x^4}{xy^3}$ dir.

Çözüm: Denklemin $y' = f(x,y)$ biçiminde, yani $f(x,y) = \frac{2y^4 + x^4}{xy^3}$ dir.

$f(tx, ty) = \frac{2(ty)^4 + (tx)^4}{(tx)(ty)^3} = \frac{t^4(2y^4 + x^4)}{t^4(xy^3)} = f(x,y)$

olduğundan verilen denklemin homojendir. $y = vx$ alalım:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2y^4 + x^4}{xy^3} \Rightarrow vx + x \frac{dv}{dx} = \frac{2(vx)^4 + x^4}{x(vx)^3} = 0$$

$$\Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{v^4 + 1}{v^3} \Rightarrow \frac{dx}{x} = \frac{v^3 dv}{v^4 + 1}$$

$$\Rightarrow \ln x - \frac{1}{4} \ln(v^4 + 1) = -\ln k^{1/4}$$

$$\Rightarrow \ln x + \ln k = \ln(v^4 + 1)^{1/4}$$

$$\Rightarrow xk = (v^4 + 1)^{1/4} \Rightarrow y^4 = C_1 x^8 - x^4, \quad (C_1 = k^4)$$

bulunur.

II. yol: $\frac{dx}{dy} = \frac{xy^3}{2y^4 + x^4}$ şeklinde ters çevrilirse $x = yu \quad (u = \frac{x}{y})$

denşümü yapılarak

$$u + y \frac{du}{dy} = \frac{(yu) \cdot y^3}{2y^4 + (yu)^4}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{y} + \frac{2 + u^4}{u + u^5} du = 0$$

$$\Rightarrow \int \frac{dy}{y} + \int \frac{2 + u^4}{u + u^5} du = C \quad (*)$$

$$\int \frac{2 + u^4}{u + u^5} du = \int \left(\frac{2}{u} - \frac{u^3}{1 + u^4} \right) du = 2 \ln u - \frac{1}{4} \ln(1 + u^4)$$

değeri $(*)$ ifadesinde yerine yonulursa

(19)

$$\ln y + 2 \ln u - \frac{1}{4} \ln(1+u^4) = C$$

$$\Rightarrow \ln y^4 u^8 = 1+u^4 \quad (C = -\frac{1}{4} \ln 4)$$

$$\Rightarrow \ln y^4 \left(\frac{x}{y}\right)^8 = 1 + \left(\frac{x}{y}\right)^4 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y^4 = C_1 x^8 - x^4 \quad (C_1 = 4^4)$$

genel çözümü bulunur.

ÖRNEK: $y' = \frac{2xy}{x^2-y^2}$ denklemin çözünüz.

$$\text{Çözüm: } f(tx, ty) = \frac{2(tx)(ty)}{(tx)^2 - (ty)^2} = \frac{t^2(2xy)}{t^2(x^2-y^2)} = f(x, y)$$

$$\text{veya } \frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{x^2-y^2} = \frac{\frac{2xy}{y^2}}{\frac{x^2-y^2}{y^2}} = \frac{2 \frac{x}{y}}{\frac{x}{y} - 1} = g\left(\frac{x}{y}\right) \quad y=vy$$

şekilde yazılabildiği için denklemin homojendir. dönüşümü yapılırsa

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{2x(vx)}{x^2 - (vx)^2}$$

$$\Rightarrow x \frac{dv}{dx} = -\frac{v(v^2+1)}{v^2-1} \Rightarrow \frac{dx}{x} + \frac{v^2-1}{v(v^2+1)} dv = 0$$

bulunur. Integral alınırsa

$$\int \frac{dx}{x} + \int \left(-\frac{1}{v} + \frac{2v}{v^2+1}\right) dv = \ln k$$

$$\ln x - \ln v + \ln(v^2+1) = \ln k$$

$$x(v^2+1) = kv$$

$$x\left(\left(\frac{y}{x}\right)^2+1\right) = k \frac{y}{x}$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = k y$$

20

Not: Bazı diferansiyel denklemlerin homojen olup olmadıklarını görmek kolay olmayabilir. Örneğin,

$$\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{ax+by+c}{px+qy+r}\right) \quad (2.8)$$

denkleminin homojen olup olmadığını ilk bakışta anlatabilirim. Bunun için $x = X+h$ ve $y = Y+k$ dönüşümleri yapılır

$$\left. \begin{aligned} ah+bk+c &= 0 \\ ph+qk+r &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (2.9)$$

denklemleri elde edilir ve bu denklemlerden h ile k bulunur.

Örnek: $\frac{dy}{dx} = 2\left(\frac{y+2}{x+y+1}\right)^2$ denklemini gözünüz.

Çözüm: Bu denklemin (2.8) tipindedir. Buradan $a=0$, $b=1$, $c=2$, $p=1$, $q=1$, $r=1$ dir. Bu değerler

(2.9)'da yerine yazılırsa

$$\left. \begin{aligned} k+2 &= 0 \\ h+k+1 &= 0 \end{aligned} \right\}$$

denklemleri sistemi elde edilir. Buradan $k=-2$ ve $h=1$ bulunur. Bu durumda

$$x = X+1$$

$$y = Y-2$$

dönüşümleri elde edilir. Bu değerler dif. denkleminde yerine yazılırsa

$$\frac{dY}{dX} = 2 \frac{Y^2}{(X+Y)^2}$$

elde edilir. Bu denklemin homojen olduğundan $Y = VX$

dönüşümü uygulanırsa,

$$V + X \frac{dV}{dX} = 2 \cdot \frac{\left(\frac{Y}{X}\right)^2}{\frac{(X+Y)^2}{X^2}} = \frac{2V^2}{(1+V)^2}$$

(21)

$$V - \frac{2V^2}{(1+V)^2} + X \frac{dV}{dX} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{(1+V)^2}{V(1+V^2)} dV + \frac{dX}{X} = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{V} + \frac{2}{1+V^2} \right) dV + \frac{dX}{X} = 0$$

$$\Rightarrow \ln V + 2 \arctan V + \ln X = c$$

$$\Rightarrow \ln \frac{Y}{X} + 2 \arctan \frac{Y}{X} + \ln X = c$$

$$\Rightarrow \ln Y + 2 \arctan \frac{Y}{X} = c$$

$$\Rightarrow \ln (y+2) + 2 \arctan \frac{y+2}{x-1} = c \quad \text{bulunur.}$$

2.5. BİRİNCİ MERTEBEDEN LINEER DİF. DENKLEMLER

Bu tip denklemler içinde

$$a(x) \cdot \frac{dy}{dx} + b(x)y = c(x)$$

şeklindeki lineer dif. denklemler önemli bir yer tutar.

Bir I aralıkta eğer $a(x) \neq 0$ ise bu denklemin bütün terimleri $a(x)$ ile bölünebilir

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x) \quad \dots \dots \dots (2.10)$$

denklemini elde edilir. Burada $p(x) = \frac{b(x)}{a(x)}$ ve $q(x) = \frac{c(x)}{a(x)}$ dir.

Eğer $q(x) = 0$ ise $\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 \quad \dots \dots \dots (2.11)$

olar ve bu denkleme (2.10) denkleminin homojen kısmı

$$- \int p(x) dx$$

denir ve çözümü $\frac{dy}{y} = -p(x) dx \Rightarrow y = c e$

olur.

(22)

Eğer $Q(x) \neq 0$ ise (2.10) dif. denkleminin

genel çözümünü $-\int p(x)dx \cdot \left[\int Q(x) \cdot e^{\int p(x)dx} dx + c \right] \dots (2.12)$

$y = e$ şeklinde olur.

ÖRNEK : $\frac{dy}{dx} - 2xy = x$ denklemini çözümlü.

Çözüm : $P(x) = -2x$ ve $Q(x) = x$ dir.

$$y = e^{-\int 2x dx} \left[\int x \cdot e^{\int 2x dx} dx + c \right]$$

elde edilir. Buradan

$$y = e^{x^2} \left[\int x e^{-x^2} dx + c \right]$$

$$y = e^{x^2} \left[-\frac{1}{2} e^{-x^2} + c \right] = -\frac{1}{2} + c e^{x^2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Not: } \int x e^{-x^2} dx \Rightarrow -x^2 = u \Rightarrow -2x dx = du \Rightarrow x dx = -\frac{du}{2} \\ -\frac{1}{2} \int e^u du = -\frac{1}{2} e^u = -\frac{1}{2} e^{-x^2} \end{array} \right\}$$

ÖRNEK : $y' + \left(\frac{1}{x}\right)y = \sin x$ denlemini çözümlü.

Çözüm : $P(x) = \frac{1}{x}$ ve $Q(x) = \sin x$ dir

$$e^{-\ln x} = e^{\ln x^{-1}} = x^{-1} = \frac{1}{x}$$

$$y = e^{-\int \frac{dx}{x}} \cdot \left[\int \sin x \cdot e^{\int \frac{dx}{x}} dx + c \right]$$

$$y = e^{-\ln x} \left[\int \sin x \cdot e^{\ln x} dx + c \right]$$

$$y = \frac{1}{x} \left[\int x \sin x dx + c \right]$$

$$y = \frac{1}{x} (-x \cos x + \sin x + c)$$

Not: $\int x \sin x dx = ?$ $\uparrow$ $\int x = u$, $\sin x dx = dv$ $\downarrow$ i

$$\boxed{\int u dv = uv - \int v du}$$

Kismi integrasyon

$$\int x \sin x dx = -x \cos x + \int \cos x dx = -x \cos x + \sin x$$

(23)

ÖRNEK : $e^x [y - 3(e^x + 1)^2] dx + (e^x + 1) dy = 0$

denklemini çözünüz.

Çözüm : $(e^x + 1) \frac{dy}{dx} + e^x y - 3e^x (e^x + 1)^2 = 0$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} + \frac{e^x}{e^x + 1} y = 3e^x (e^x + 1)$$

denlemine döner. Burada $P(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$, $Q(x) = 3e^x (e^x + 1)$.

$$y = e^{-\int \frac{e^x dx}{e^x + 1}} \cdot \left[\int 3e^x (e^x + 1) \cdot e^{\int \frac{e^x dx}{e^x + 1}} dx + c \right]$$

$$\Rightarrow y = e^{-\ln(e^x + 1)} \cdot \left[\int 3e^x (e^x + 1) \cdot e^{\ln(e^x + 1)} dx + c \right]$$

$$= \frac{1}{e^x + 1} \left[3 \int e^x (e^x + 1)^2 dx + c \right] \quad \left\{ \begin{array}{l} e^x + 1 = u \\ e^x dx = du \\ \int e^x (e^x + 1)^2 dx = \int u^3 du \\ = \frac{u^4}{4} \end{array} \right.$$

$$= \frac{1}{e^x + 1} \cdot [(e^x + 1)^3 + c]$$

ÖRNEK : $\frac{du}{dx} + 2x^2 u = 2x^2$ denklemini çözünüz.

Çözüm : $P(x) = 2x^2$, $Q(x) = 2x^2$ dir.

$$u = e^{-\int P(x) dx} \left[\int Q(x) \cdot e^{\int P(x) dx} dx + c \right]$$

$$\Rightarrow u = e^{-\frac{2}{3}x^3} \left[\int 2x^2 \cdot e^{\frac{2}{3}x^3} dx + c \right]$$

$$\Rightarrow u = e^{-\frac{2}{3}x^3} (e^{\frac{2}{3}x^3} + c)$$

bulunur.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Not: } \int 2x^2 e^{\frac{2}{3}x^3} dx = ? \\ \Rightarrow \int e^u du = e^u + c = e^{\frac{2x^3}{3}} + c \end{array} \right. \quad \left. \begin{array}{l} \frac{2x^3}{3} = u \Rightarrow 2x^2 dx = du \\ \frac{2x^3}{3} \end{array} \right\}$$

2.6. BERNULLI DENKLEMİ

(24)

Birinci mertebeden bir adı diferansiyel denklem,

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = y^n \cdot Q(x) \quad \dots \quad (2.13)$$

şeklinde ise bu dif. denkleme Bernoulli denklemi denir.

Bu denklemi çözümler için önce denklemin bütün terimleri

y^{-n} ile çarpılırsa

$$y^{-n} \cdot \frac{dy}{dx} + p(x)y^{1-n} = Q(x) \quad \dots \quad (2.14)$$

elde edilir. $v = y^{1-n}$ dönüşümü yapılırsa

$$\frac{dv}{dx} = (1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx}$$

bulunur. Bu bağıntı (2.14)'de yerine yazılırsa

(2.15)

$$\frac{dv}{dx} + A(x) \cdot v = B(x)$$

denklemi elde edilir. $\begin{cases} A(x) = (1-n)p(x) \text{ ve } B(x) = (1-n)Q(x) \end{cases}$

ÖNEMLİ: $\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = -\frac{y^2}{x}$ denklemini gözünüz.

ÇÖZÜM: Verilen denklem Bernoulli dif. denklemdir. y^{-2} ile

$$p(x) = -\frac{1}{x}, \quad Q(x) = -\frac{1}{x} \text{ ve } n=2 \text{ dir. Denklem } y^{-2} \text{ ile}$$

çarpılırsa $y^{-2} \frac{dy}{dx} - \frac{1}{x} y^{-1} = -\frac{1}{x}$ (*)

olur. Burada $v = y^{-1}$ dönüşümü yapılırsa

$$\frac{dv}{dx} = \frac{dv}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = -y^{-2} \cdot \frac{dy}{dx}$$

olacağından bu eşitlikten

$$-\frac{dv}{dx} = y^{-2} \frac{dy}{dx}$$

bulunur ki bulunur bu değer (*)'da yerine yazılırsa 24

$$\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x}$$

elde edilir. $- \int \frac{1}{x} dx \cdot \left[\int Q(x) \cdot e^{\int \frac{1}{x} dx} \cdot dx + c \right]$

$$v = e$$

$$v = \frac{1}{x} \left[\int dx + c \right] = \frac{1}{x} [x + c]$$

$$\Rightarrow \frac{1}{y} = \frac{1}{x} [x + c] \Rightarrow y = \frac{1}{1 + \frac{c}{x}}$$

örnek: $\frac{dy}{dx} + \frac{2}{x}y = y^3 x^{-2}$ denklemini çözünüz.

çözüm: Denlemi y^{-3} ile çarpalım:

$$y^{-3} \frac{dy}{dx} + \frac{2}{x} \left(y^{-2} \right) = x^{-2}$$

olar. $v = y^{-2}$ denizini yapırsa $\frac{dv}{dx} = -2y^{-3} \frac{dy}{dx}$

Çagından $y^{-3} \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2} \frac{dv}{dx}$

ifadeni $\otimes$ eziğinde yerhe yarılrsa

$$-\frac{1}{2} \frac{dv}{dx} + \frac{2}{x}v = x^{-2}$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{dx} - \frac{4}{x}v = -2x^{-2}$$

$$\Rightarrow v = e^{\int \frac{4}{x} dx} \left[\int -2x^{-2} e^{-\int \frac{4}{x} dx} dx + c \right]$$

$$= x^4 \left[\int -2x^{-2} x^{-4} dx + c \right] = x^4 \left[\frac{2}{5} x^{-5} + c \right]$$

$$\Rightarrow v = \frac{2}{5x} + cx^4 \Rightarrow y^{-2} = \left(\frac{2}{5x} + cx^4 \right)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\Rightarrow y = \left(\frac{2}{5x} + cx^4 \right)^{-\frac{1}{2}}$$

bulunur.

(26)

ÖRNEK: $x \frac{dy}{dx} + y = -2x^6 y^4$ denklemini çözümlü.

Çözüm: $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -2x^5 y^4$ denklemini y^{-4} ile çarparsak

$$y^{-4} \frac{dy}{dx} + \frac{1}{x} \left(\frac{-3}{y} \right) = -2x^5 \quad (*)$$

olar. $v = y^{-3}$ dönüşümü yapılarak $\frac{dv}{dx} = -3y \frac{dy}{dx}$ ifadesi bulunur ve $(*)$ eşitliğinde bu ifadeler yerine yazılır

$$-\frac{1}{3} \frac{dv}{dx} + \frac{1}{x} v = -2x^5$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{dx} - \frac{3}{x} v = 6x^5$$

$$\Rightarrow v = e^{\int \frac{3}{x} dx} \left[\int 6x^5 \cdot e^{-\int \frac{3}{x} dx} dx + c \right]$$

$$v = x^3 \left[\int 6x^5 \cdot x^{-3} \cdot dx + c \right]$$

$$v = x^3 (2x^3 + c)$$

$$y^{-3} = x^3 (2x^3 + c) \Rightarrow y = \frac{1}{x} (2x^3 + c)^{-\frac{1}{3}}$$
 bulunur.

ÖRNEK $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{2x} = xy^{-3}$, $y(1)=2$ başlangıç değer problemi için

Çözüm $y^3 \frac{dy}{dx} + \frac{1}{2x} y^4 = x$, $u=y^4$, $\frac{du}{dx} = 4y^3 \frac{dy}{dx}$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} \frac{du}{dx} + \frac{1}{2x} u = x \Rightarrow \frac{du}{dx} + \frac{2}{x} u = 4x$$

$$\Rightarrow y^4 = x^2 + cx^{-2} \text{ bulunur.}$$

$$y(1)=2 \text{ olduğundan } x=1 \text{ ve } y=2 \text{ için}$$

$$2^4 = 1^2 + c \Rightarrow c=15 \text{ olup}$$

$$y^4 = x^2 + 15x^{-2}$$

bulunur.

(27)

2.7. RICCATI DİFERENSİYEL DENKLEMİ

Tanım: $\frac{dy}{dx} = q_1(x) + q_2(x)y + q_3(x)y^2 \dots$ (2.16)

Şeklindeki dif. denkleme Riccati diferansiyel denklemini denir. Bu tür denklemleri analitik olarak çözümler mümkün değildir.

Eğer y_1 özel çözümü biliniyorsa genel çözümü

$$y = y_1 + \frac{1}{v} \quad (2.17)$$

bağıntısı yardımıyla çözülür. y_1 , (2.16) ile verilen denklemin bir çözümünü aldığını göre

$$y_1' = q_1 + q_2 y_1 + q_3 y_1^2$$

olar. (2.17) den

$$y' = y_1' - \frac{v'}{v^2} \dots \dots \dots (2.18)$$

elde edilir. (2.16) denkleminde (2.17) ve (2.18) bağıntılarını yerlerine yazılırsa

$$y_1' - \frac{v'}{v^2} = q_1 + q_2 \left(y_1 + \frac{1}{v}\right) + q_3 \left(y_1 + \frac{1}{v}\right)^2$$

olar. Bu denklemleri düzenlerse

$$\frac{dv}{dx} = -(q_2 + 2q_3 y_1)v - q_3$$

elde edilir ki bu denklemler v 'ye göre birinci mertebeden lineer dif. denklemdir. Bu denklemler ise daha önceki metotlarla çözümlenebilir.

Not: Riccati denklemlerinde $y = y_1 + \frac{1}{v}$ dengelemi yerine

bazen $y = y_1 + z$ dönüşümü de yapılabilir.

Not: Riccati denklemlerindeki y_1 özel çözümü analitik olarak bulmak namadığı için genelde deneme - yanılma yöntemiyle tespit edilir.

(28)

ÖRNEK : $y' = 1 + x^2 - 2xy + y^2$ denkleminin özel bir

çözümü $y_1 = x$ olduğuna göre denklemin genel çözümü nedir?

Çözüm : Bu denklem $q_1 = 1 + x^2$, $q_2 = -2x$ ve $q_3 = 1$ şeklinde verilen bir Riccati denklemdir.

$y = y_1 + \frac{1}{v} = x + \frac{1}{v}$ dönüşümü yapılırsa $y' = 1 - \frac{v'}{v^2}$ olur. y ve y' ifadelerini verilen denkleme yerlerine yazarak

$$1 - \frac{v'}{v^2} = 1 + x^2 - 2x\left(x + \frac{1}{v}\right) + \left(x + \frac{1}{v}\right)^2$$

yarınabilir. Gereklili işlemler ve sadeleşmelerden sonra

$$v' = -1 \Rightarrow v = -x + C \quad \left\{ y = x + \frac{1}{v} \Rightarrow v = \frac{1}{y-x} \right\}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{y-x} = -x + C$$

$$\Rightarrow y = x + \frac{1}{C-x}$$

bulunur.

ÖRNEK : $y' = 2 \tan x \sec x - y^2 \sin x$ denkleminin özel bir çözümü

$y_1 = \sec x$ olduğuna göre denklemin genel çözümünü bulunuz.

$$\begin{cases} (\sec x)' = \tan x \cdot \sec x \\ (\cos \sec x)' = -\cos x \cdot \sec^2 x \end{cases}$$

Çözüm : $y = y_1 + \frac{1}{v} = \sec x + \frac{1}{v}$ dönüşümü yapalım. $(\cos \sec x)' = -\cos x \cdot \sec^2 x$

$y' = \tan x \cdot \sec x - \frac{v'}{v^2}$ old. y ve y' ifadeleri denkleme yazalım

$$\tan x \cdot \sec x - \frac{v'}{v^2} = 2 \tan x \cdot \sec x - \left(\sec x + \frac{1}{v} \right)^2 \sin x$$

$$\Rightarrow v' - (2 \tan x) v - \sin x = 0$$

bu bir df. denklemin elde edilir.

$$v = e^{\int 2 \tan x dx} \cdot \left[\int \sin x \cdot e^{-\int 2 \tan x dx} dx + C \right]$$

$$= e^{-2 \ln \cos x} \cdot \left[\sin x \cdot e^{2 \ln \cos x} dx + C \right]$$

$$v = \frac{1}{\cos^2 x} \left[\int \cos^2 x \cdot \sin x \, dx + c \right]$$

$$v = \frac{1}{\cos^2 x} \left[-\frac{\cos^3 x}{3} + c \right] = \frac{c - \cos^3 x}{3 \cos^2 x}$$

$$\Rightarrow y = \sec x + \frac{3 \cos^2 x}{c - \cos^2 x}$$

ÖRNEK: $y' + y^2 + \frac{1}{x}y - \frac{4}{x^2} = 0$ denkleminin özel bir çözümü $y_1 = \frac{2}{x}$ ile verilmiştir. Denklemin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm: $y = y_1 + \frac{1}{v} = \frac{2}{x} + \frac{1}{v}$ dön. yapılsa $y' = -\frac{2}{x^2} - \frac{v'}{v^2}$ olur.

Bu ifadeler verilen denkleme yerine yerlerse

$$\left(-\frac{2}{x^2} - \frac{v'}{v^2} \right) + \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{v} \right)^2 + \frac{1}{x} \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{v} \right) - \frac{4}{x^2} = 0$$

$$\Rightarrow v' - \frac{2}{x}v = -1 \quad \text{lineer dif. denklemi bulunur.}$$

$$\Rightarrow v = e^{\int \frac{2}{x} dx} \left[\int (-1) \cdot e^{-\int \frac{2}{x} dx} dx + c \right]$$

$$= e^{5 \ln x} \left[\int -e^{-5 \ln x} dx + c \right]$$

$$= x^5 \left[\int -x^{-5} dx + c \right]$$

$$= x^5 \left[-\frac{x^{-4}}{-4} + c \right]$$

$$\Rightarrow v = \frac{x}{4} + cx^5$$

$$\Rightarrow y = \frac{2}{x} + \frac{4}{x + 4cx^5}$$

genel çözümü bulunur.

(30)

NOT: Bazen $y = y_1 + \frac{1}{v}$ dönüşümü yerine $y = y_1 + z$ dönüşümü de yapılabilir.

ÖRNEK: $y' + xy^2 - y = \frac{1}{x^2}$ denkleminin özel bir çözümünü

$y_1 = \frac{1}{x}$ olduğunu göre denklemin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm: $y = y_1 + z = \frac{1}{x} + z$ dön. yapılırsa $y' = -\frac{1}{x^2} + z'$ olur

$$\Rightarrow \left(-\frac{1}{x^2} + z'\right) + x\left(\frac{1}{x} + z\right)^2 - \left(\frac{1}{x} + z\right) = -\frac{1}{x^2}$$

$$\Rightarrow z' + z = -xz^2 \quad \text{Bernoulli denklemi bulunuz.}$$

Her iki taraf z^{-2} ile çarpılırsa

$$z^{-2} \cdot z' + z^{-1} = -x \quad \dots \dots \dots (*) \quad \frac{dv}{dz} = \frac{dz}{dx} = -1 \cdot z^{-2} \cdot \frac{dz}{dx}$$

olar. $v = z^{-1}$ dönüşümü yapılırsa $\frac{dv}{dz} = \frac{dz}{dx} = -1 \cdot z^{-2} \cdot \frac{dz}{dx}$

olar ki $(*)$ eşitliğinde yerine yarırsa

$$\frac{dv}{dx} - v = x$$

linear denklemi bulunuz.

$$\Rightarrow v = e^{\int 1 dx} \left[\int x e^{-\int 1 dx} dx + c \right]$$

$$= e^x \left[\int x e^{-x} dx + c \right]$$

$$= e^x \left[-x e^{-x} - e^{-x} + c \right]$$

$$\Rightarrow v = -x - 1 + c e^x$$

$$\Rightarrow z = \frac{1}{v} = \frac{1}{-x - 1 + c e^x}$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{x} + z = \frac{1}{x} + \frac{1}{-x - 1 + c e^x}$$

genel çözümü bulunuz.

Gözünü SORULAR (Birinci mert. Adi Dif. Denklemler)

① $3x(xy-2)dx + (x^3+2y)dy=0$ tam dif. denklemin gözünüz.

Gözünüz: $M = 3x(xy-2)$ ve $N = (x^3+2y)$ dir.

$\frac{\partial M}{\partial y} = 3x^2$ ve $\frac{\partial N}{\partial x} = 3x^2$ olup $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ old. denklemler

Tam dif. denklemdir.

$\frac{\partial f}{\partial x} = M = 3x^2y - 6x$ eşitliğinde integral alınır

$f(x,y) = \int (3x^2y - 6x) dx + \phi(y)$

$\Rightarrow f(x,y) = x^3y - 3x^2 + \phi(y)$

bulunur. y 'ye göre türev alınır

$\frac{\partial f}{\partial y} = x^3 + \frac{d\phi}{dy}$

olur. $\frac{\partial f}{\partial y} = N = x^3 + 2y$ eşitliği (*) da yerine yazılırsa

$x^3 + 2y = x^3 + \frac{d\phi}{dy}$

$\Rightarrow \frac{d\phi}{dy} = 2y \Rightarrow \phi(y) = y^2 + C_0$

bulunur. $\phi(y)$ nin bu değeri (*) eşitliğinde yerine

yazılırsa

$f(x,y) = x^3y - 3x^2 + y^2 + C_0 = C_1$

$\Rightarrow x^3y - 3x^2 + y^2 = C$

genel çözümü bulunur.

(32)

② $(2xy - y)dx + (x^2 - x)dy = 0$ tam dif. denklemini çözünüz.

Çözüm: $M = 2xy - y$ ve $N = x^2 - x$ dir.

$\frac{\partial M}{\partial y} = 2x - 1$, $\frac{\partial N}{\partial x} = 2x - 1$ olup $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ old.

denklemin TDD'dir.

$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy - y$ eşitliğinde integral alınırsa

$F(x, y) = \int (2xy - y)dx + \phi(y)$

$\Rightarrow F(x, y) = x^2y - yx + \phi(y)$) y'ye göre türev

$\Rightarrow \frac{\partial F}{\partial y} = x^2 - x + \frac{d\phi}{dy}$ (*)

elde edilir. $\frac{\partial f}{\partial y} = N = x^2 - x$ eşitliği (*) da yerine yazılırsa

$x^2 - x = x^2 - x + \frac{d\phi}{dy}$

$\Rightarrow \frac{d\phi}{dy} = 0 \Rightarrow \phi(y) = C_0$ bulunur.

$\phi(y)$ nin bu değeri (*) eşitliğinde yerine yazılırsa

$F(x, y) = x^2y - yx + C_0 = C_1$

$\Rightarrow x^2y - yx = C$

genel çözümü bulunur.

33

3) $(2x + y \cos(xy)) dx + x \cos(xy) dy = 0$ denklemini çözün.

Çözüm: $M = 2x + y \cos(xy)$ ve $N = x \cos(xy)$ verilmiş.

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial y} &= 1 \cdot \cos(xy) - y \cdot x \cdot \sin(xy) \\ \frac{\partial N}{\partial x} &= 1 \cdot \cos(xy) - xy \sin(xy) \end{aligned} \right\} \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \text{ old. TDD'dir.}$$

$\frac{\partial f}{\partial x} = M = 2x + y \cos(xy)$ ifadesinde integral alınır

$$f(x,y) = \int [2x + y \cos(xy)] dx + \phi(y)$$

$$f(x,y) = x^2 + y \cdot \frac{1}{y} \cdot \sin(xy) + \phi(y)$$

$$f(x,y) = x^2 + \sin(xy) + \phi(y) \quad \text{bulunur.}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x \cos(xy) + \frac{d\phi}{dy} \quad \text{Türev}$$

$\frac{\partial f}{\partial y} = N = x \cos(xy)$ olduğundan

$$x \cos(xy) = x \cos(xy) + \frac{d\phi}{dy}$$

$$\Rightarrow \frac{d\phi}{dy} = 0 \Rightarrow \phi(y) = C_0$$

$$\Rightarrow f(x,y) = x^2 + \sin(xy) + C_0 = C_1$$

$$\Rightarrow x^2 + \sin(xy) = C$$

genel çözümü bulunur.

(34)

4) $(2xy \cos x^2 - 2xy + 1)dx + (\sin x^2 - x^2)dy = 0$
denklemini gözünüz.

Gözünüz: $\left. \begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial y} &= 2x \cos x^2 - 2x \\ \frac{\partial N}{\partial x} &= 2x \cos x^2 - 2x \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{denklemin TDD'dir.}$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2xy \cos x^2 - 2xy + 1$$

$$\Rightarrow F(x,y) = \int (2xy \cos x^2 - 2xy + 1) dx + \phi(y)$$

$$\Rightarrow F(x,y) = 2y \underbrace{\int x \cos x^2 dx}_{I_1} - 2y \int x dx + \int dx + \phi(y)$$

$$\left\{ \begin{aligned} I_1 &= \int x \cos x^2 dx = ? & x^2 &= u \Rightarrow 2x dx = du \Rightarrow x dx = \frac{du}{2} \\ &\Rightarrow \int x \cos x^2 dx = \frac{1}{2} \int \cos u du = \frac{1}{2} \sin u = \frac{1}{2} \sin x^2 \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow F(x,y) = 2y \cdot \frac{1}{2} \sin x^2 - 2y \frac{x^2}{2} + x + \phi(y)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial F}{\partial y} = \sin x^2 - x^2 + \frac{d\phi}{dy}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial F}{\partial y} = N = \sin x^2 - x^2 \quad \text{eşitlikten faydalanırsa}$$

$$\sin x^2 - x^2 = \sin x^2 - x^2 + \frac{d\phi}{dy}$$

$$\Rightarrow \frac{d\phi}{dy} = 0 \Rightarrow \phi(y) = C_0$$

$$\Rightarrow F(x,y) = y \sin x^2 - y x^2 + x = C$$

genel gözünüzü bulunur.

(35)

$$(5) (x^2 + 3y^2)dx + 2xy dy = 0 \text{ denklemini gözünüz.}$$

Çözümü: $\frac{\partial M}{\partial y} = 6y$, $\frac{\partial N}{\partial x} = 2y$ olup PDD değildir.

$$f(x) = \frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) = \frac{1}{2xy} (6y - 2y) = \frac{2}{x}$$

fonksiyonu sadece x 'e bağlıdır. Bu nedenle

$$\mu = e^{\int f(x) dx} = e^{\int \frac{2}{x} dx} = e^{2 \ln x} = e^{\ln x^2} = x^2$$

$$\Rightarrow \mu = x^2 \text{ integral çarpanıdır.}$$

Soruda verilen denklemin tüm terimleri x^2 ile çarpılırsa denklem TDD'ye dönüşür.

$$x^2 (x^2 + 3y^2) dx + x^2 (2xy) dy = 0$$

$$\Rightarrow \underbrace{(x^4 + 3x^2 y^2)}_{M_1} dx + \underbrace{2x^3 y}_{N_1} dy = 0$$

denklemi TDD'dir.

$$\frac{\partial F}{\partial x} = M_1 = x^4 + 3x^2 y^2 \quad \text{eşitliğinde integral alınırsa}$$

$$F(x, y) = \int (x^4 + 3x^2 y^2) dx + \phi(y) \quad (*)$$

$$\Rightarrow F(x, y) = \frac{x^5}{5} + x^3 y^2 + \phi(y) \quad \text{ve terim alınırsa}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial F}{\partial y} = 2x^3 y + \frac{d\phi}{dy} \quad (**)$$

bulunur. $\frac{\partial F}{\partial y} = N_1 = 2x^3 y$ ifadesi ~~(*)~~ da yerine yazılırsa

$$2x^3 y = 2x^3 y + \frac{d\phi}{dy} \Rightarrow \frac{d\phi}{dy} = 0 \Rightarrow \phi(y) = C_0$$

$$\Rightarrow F(x, y) = \frac{x^5}{5} + x^3 y^2 = C$$

genel çözümü bulunur.

36

⑥ $(y^2 - y)dx + xdy = 0$ denklemini çözüyoruz.

Çözüm: Denklemin TDD değildir.

$y^2dx = \underbrace{ydx - xdy}$ olarak yandabildiğinden integral

karpanı $\frac{1}{y^2}$ alınırsa

$$\frac{y^2dx}{y^2} = \frac{ydx - xdy}{y^2} \Rightarrow dx = \frac{ydx - xdy}{y^2}$$

$$\Rightarrow dx = d\left(\frac{x}{y}\right) \Rightarrow \int dx = \int d\left(\frac{x}{y}\right)$$

$$\Rightarrow x = \frac{x}{y} + C$$

⑦ $\cos y \frac{dy}{dx} + 2x - 2x \sin y = 0$ denklemini değişkenlerine ayıra-

rak çözüyoruz.

Çözüm: $\cos y \frac{dy}{dx} = 2x(\sin y - 1)$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{2x(\sin y - 1)}{\cos y}$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{\cos y}{2x(\sin y - 1)}$$

$$\Rightarrow \int 2x dx = \int \frac{\cos y dy}{\sin y - 1}$$

$$\Rightarrow x^2 = \ln |\sin y - 1| + C$$

$$\Rightarrow \sin y - 1 = e^{x^2 + C}$$

(37)

8) $\sin x \cos y \, dx + \cos x \sin y \, dy = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm: $\int \frac{\sin x \, dx}{\cos x} + \int \frac{\sin y \, dy}{\cos y} = 0$

$$\Rightarrow -\ln(\cos x) - \ln(\cos y) = -\ln c$$

$$\ln(\cos x) + \ln(\cos y) = \ln c$$

$$\ln(\cos x \cdot \cos y) = \ln c$$

$$\cos x \cdot \cos y = c$$

9) $(xy + 2x + y + 2) \, dx + (x^2 + x) \, dy = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm: $[y(x+1) + 2(x+1)] \, dx + [x^2 + x] \, dy = 0$

$$(x+1)(y+2) \, dx + (x^2 + x) \, dy = 0$$

$$\frac{x+1}{x^2+x} \, dx + \frac{dy}{y+2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \int \frac{2x+2}{x^2+x} \, dx + \int \frac{dy}{y+2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \left[\int \frac{2x+1}{x^2+x} \, dx + \int \frac{dx}{x^2+x} \right] + \int \frac{dy}{y+2} = 0$$

$$\frac{1}{2} \left[\int \frac{2x+1}{x^2+x} \, dx + \int \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) \, dx + \int \frac{dy}{y+2} = 0 \right]$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} [\ln(x^2+x) + \ln(x) - \ln(x+1)] + \ln(y+2) = \ln c$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{1}{2}}{x+1} \cdot \frac{(x^2+x) \cdot x \cdot (y+2)}{x+1} = c$$

$$\Rightarrow x^2(y+2) = c$$

(38)

$$(10) \quad (x^2 - xy + y^2) dx - xy dy = 0$$

homogen dif. denkleminin çözümü.

$$\text{Çözüm: } \frac{dy}{dx} = \frac{x^2 - xy + y^2}{xy} = \frac{x}{y} - 1 + \frac{y}{x}$$

olup denklem homogenidir. Değişkenler $y = vx$ dönüşümü uygulanırsa,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y} - 1 + \frac{y}{x}$$

$$\left\{ v = \frac{y}{x} \right\}$$

$$\cancel{v} + x \frac{dv}{dx} = \frac{1}{v} - 1 + \cancel{v}$$

$$x \frac{dv}{dx} = \frac{1-v}{v} \Rightarrow \frac{dx}{x} = \frac{v dv}{1-v}$$

$$\Rightarrow \int \frac{dx}{x} - \int \frac{v dv}{v-1} = 0$$

$$\int \frac{dx}{x} - \int \frac{v-1+1}{v-1} dv = 0$$

$$\int \frac{dx}{x} - \int dv - \int \frac{dv}{v-1} = 0$$

$$\ln x - v - \ln(v-1) = C$$

$$\ln x - \frac{y}{x} - \ln\left(\frac{y}{x} - 1\right) = C$$

genel çözümü bulunur.

11) $y dx = (x + \sqrt{y^2 - x^2}) dy$ homojen denk. çözülmü. 39

Çözüm: $\frac{dx}{dy} = \frac{x + \sqrt{y^2 - x^2}}{y}$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{\frac{x}{y} + \sqrt{\frac{y^2 - x^2}{y^2}}}{1} = \frac{\frac{x}{y} + \sqrt{1 - \left(\frac{x}{y}\right)^2}}{1}$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{x}{y} + \sqrt{1 - \left(\frac{x}{y}\right)^2}$$

old. denklemin homojendir. $x = uy$ dönüşümü yapılırsa
 $\frac{dx}{dy} = u + y \frac{du}{dy}$ türevi yukarıda yerine yazılır

$$\frac{dx}{dy} = \frac{x}{y} + \sqrt{1 - \left(\frac{x}{y}\right)^2}$$

$$\Rightarrow u + y \frac{du}{dy} = u + \sqrt{1 - u^2}$$

$$\frac{dy}{y} = \frac{du}{\sqrt{1 - u^2}}$$

$$\ln y = \arcsin u + \ln c$$

$$\ln \left| \frac{y}{c} \right| = \arcsin \frac{x}{y} \quad \arcsin \frac{x}{y}$$

$$\frac{y}{c} = e^{\arcsin \frac{x}{y}} \Rightarrow y = c \cdot e^{\arcsin \frac{x}{y}}$$

Not: Bu denklemin $y = vx$ dönüşümü yapılarak da çözülebilir. Fakat integral işlemleri uzun süreceği için $x = uy$ dönüşümü tercih edilmiştir.

40

12) $y' = \frac{2y+x}{x}$ homojen dif. denklemini çözüünüz.

Çözüm: $\frac{dy}{dx} = \frac{2y+x}{x} = 2\frac{y}{x} + 1$

$y = vx$ dönüşümü yapalım:

$$\frac{dy}{dx} = 2\frac{y}{x} + 1$$

$$\Rightarrow v + x \frac{dv}{dx} = 2v + 1$$

$$\Rightarrow x \frac{dv}{dx} = v + 1$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{v+1} = \frac{dx}{x}$$

$$\Rightarrow \ln x = \ln(v+1) + \ln c_1$$

$$\Rightarrow \ln x = \ln\left(\frac{y}{x} + 1\right) + \ln c_1$$

$$\Rightarrow x = \left(\frac{y+x}{x}\right) c_1$$

$$\Rightarrow x^2 = (y+x) c_1$$

$$y + x = \frac{x^2}{c_1}$$

$$\Rightarrow y + k = cx^2$$

genel çözümü bulunur.

(41)

$$(13) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{x-2y+6}{2x+y+2}$$

homogen dif. denklemini gözünüz.

$$\text{Gözüm: } \left. \begin{array}{l} a=1, \quad b=-2, \quad c=6 \\ p=2, \quad q=1, \quad r=2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 1 \cdot h - 2k + 6 = 0 \\ 2h + 1 \cdot k + 2 = 0 \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} h=-2 \\ k=2 \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} x = \frac{x-2}{y+2} \\ y = \frac{y+2}{y+2} \end{array} \right\} \text{dönüşümü yapalım.}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x-2-2y-4+6}{2x-4+y+2+2} = \frac{x-2y}{2x+y} = \frac{1-2\frac{y}{x}}{2+\frac{y}{x}}$$

$$\Rightarrow y = vx \text{ dönüşümü yapalım}$$

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{1-2v}{2+v} \Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{1-4v-v^2}{2+v}$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{x} + \frac{2+v}{v^2+4v-1} = 0 \quad \text{eşitliğinde integral alınır}$$

$$\ln x + \frac{1}{2} \ln(v^2+4v-1) = \ln c$$

$$\ln x + \frac{1}{2} \ln\left(\frac{y^2}{x^2} + 4\frac{y}{x} - 1\right) = \ln c$$

$$\ln(x+2) + \ln\left(\frac{(y-2)^2}{(x+2)^2} + 4\frac{y-2}{x+2} - 1\right)^{\frac{1}{2}} = \ln c$$

$$(x+2) \cdot \sqrt{\frac{(y-2)^2}{(x+2)^2} + 4\frac{y-2}{x+2} - 1} = c$$

genel çözümü bulunur.

(42)

14) $\frac{dy}{dx} = \frac{3x-y+1}{3y-x+5}$ homojen denkleminin gözönü.

Çözümü: $\frac{dy}{dx} = \frac{3x-y+1}{-x+3y+5} \Rightarrow a=3, b=-1, c=1$
 $p=-1, q=3, r=5$

$$\left. \begin{aligned} 3h-k+1 &= 0 \\ -h+3k+5 &= 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} h &= -1 \\ k &= -2 \end{aligned}$$

$\left. \begin{aligned} x &= X-1 \\ y &= Y-2 \end{aligned} \right\}$ dönüşümü yapalım:

$$\frac{dY}{dX} = \frac{3X-3Y+2+1}{3Y-6-X+1+5} = \frac{3X-Y}{3Y-X} = \frac{3-\frac{Y}{X}}{\frac{Y}{X}}$$

$$\Rightarrow V+X \frac{dV}{dX} = \frac{3-V}{3V-1} \Rightarrow \frac{dX}{X} = \frac{(3V-1)dV}{3-3V^2}$$

$$\Rightarrow \int \frac{dX}{X} + \frac{1}{3} \int \frac{3V-1}{V^2-1} dV = 0 \quad \dots \dots \dots$$

$$I = \int \frac{3V-1}{V^2-1} dV = \int \left(\frac{A}{V-1} + \frac{B}{V+1} \right) dV \Rightarrow A=1, B=2 \text{ bulunur.}$$

$$\int \frac{dX}{X} + \frac{1}{3} \left(\int \frac{1}{V-1} dV + 2 \int \frac{dV}{V+1} \right) = \ln C$$

$$\Rightarrow \ln X + \frac{1}{3} (\ln(V-1) + 2 \ln(V+1)) = \ln C$$

$$\Rightarrow \ln(X \cdot (V-1)^{\frac{1}{3}} \cdot (V+1)^{\frac{2}{3}}) = \ln C$$

$$\Rightarrow \ln(X \cdot (\frac{Y}{X}-1)^{\frac{1}{3}} \cdot (\frac{Y}{X}+1)^{\frac{2}{3}}) = \ln C$$

$$\Rightarrow (X+1) \cdot \left(\frac{Y+2}{X+1} - 1 \right)^{\frac{1}{3}} \cdot \left(\frac{Y+2}{X+1} + 1 \right)^{\frac{2}{3}} = C$$

genel çözümü bulunur.

(43)

(15) $\frac{dy}{dx} + y = xy^3$ denklemini gözünüz (Bernoulli)

Çözüm: Her iki taraf y^{-3} ile çarpılırsa

$$\textcircled{*} \dots \left[y^{-3} \frac{dy}{dx} + y^{-2} = x \right] \Rightarrow v = y^{-2} \text{ dönüşümü yapılır}$$

$$\frac{dv}{dx} = \frac{dv}{dy} \frac{dy}{dx} = -2y^{-3} \frac{dy}{dx} \text{ bulunur. Buradan } y^{-3} \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2} \frac{dv}{dx}$$

olup $\textcircled{*}$ eşitliğinde yerine yazılırsa

$$-\frac{1}{2} \frac{dv}{dx} + v = x \Rightarrow \frac{dv}{dx} - 2v = -2x$$

lineer denlemine döndür. Bunun çözümü ise

$$v = e^{-\int (-2) dx} \left[\int (-2x) \cdot e^{-\int 2 dx} \cdot dx + c \right]$$

$$= e^{2x} \left[\int \underbrace{e^{-2x} \cdot (-2x) dx}_{(\text{Kismi Int})} + c \right]$$

$$\Rightarrow v = e^{2x} \left(x e^{-2x} + \frac{1}{2} e^{-2x} + c \right)$$

olur. $v = y^{-2}$ olduğuna göre

$$y^{-2} = e^{2x} \left(x e^{-2x} + \frac{1}{2} e^{-2x} + c \right)$$

genel çözümü bulunur.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Not: } \int (-2x) e^{-2x} dx = ? \cdot \left\{ \begin{array}{l} u = -2x, \quad e^{-2x} dx = dv \\ dv = -2 dx, \quad -\frac{1}{2} e^{-2x} = v \end{array} \right\} \\ \int (-2x) e^{-2x} dx = x e^{-2x} - \int e^{-2x} dx = x e^{-2x} + \frac{1}{2} e^{-2x} + c \end{array} \right\}$$

16) $dx - 2xy^{-1}dy = x^4dy$ denklemini çözünüz. (Bernoulli) (44)

Gözünüz: Denklemin her tarafı dy ile bölünürse Bernoulli denklemini elde edilir. Ayrıca denklemin her iki tarafını da x^4 ile bölerseniz

$$x^{-4} \frac{dx}{dy} - \frac{2}{y} x^{-3} = 1 \quad \dots \quad (*)$$

haline gelir. $v = x^{-3}$ dönüşümü yapılırsa

$$\frac{dv}{dy} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dy} = -3x^{-4} \frac{dx}{dy}$$

$$\Rightarrow x^{-4} \frac{dx}{dy} = -\frac{1}{3} \frac{dv}{dy}$$

bulunur. Böylece $(*)$ denklemini

$$-\frac{1}{3} \frac{dv}{dy} - \frac{2}{y} v = 1$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{dy} + \frac{6}{y} v = -3$$

linear denklemini elde edilir. Buradan

$$v = e^{-\int \frac{6}{y} dy} \left[\int (-3) \cdot e^{\int \frac{6}{y} dy} dy + C \right]$$

$$= e^{-6 \ln y} \left[\int -3 e^{6 \ln y} dy + C \right]$$

$$= y^{-6} \left[\int y^6 (-3) dy + C \right]$$

$$\Rightarrow x^{-3} y^6 = -\frac{3}{7} x^7 + C$$

genel çözümü bulunur.

(45)

(17) $y' + \frac{2}{x}y = \sqrt{y}$ dif. denklemini çözümler (Bernoulli)

Çözüm: Her iki taraf $y^{-\frac{1}{2}}$ ile çarpılırsa

*... $y^{-\frac{1}{2}}y' + \frac{2}{x}y^{\frac{1}{2}} = 1$ bulunur. $v = y^{\frac{1}{2}}$ dönüşümü ile
 $v' = \frac{1}{2}y^{-\frac{1}{2}}y' \Rightarrow y^{-\frac{1}{2}}y' = 2v'$ olacağından * denkleme

yerine yazılırsa $2v' + \frac{2}{x}v = 1 \Rightarrow v' + \frac{1}{x}v = \frac{1}{2}$

lineer dif. denkleminin elde edilir. Genel çözüm:

$$v = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left[\int \frac{1}{2} e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + c \right]$$

$$= e^{-\ln x} \left[\int \frac{1}{2} e^{\ln x} dx + c \right] = \frac{1}{x} \left[\int \frac{1}{2} x dx + c \right]$$

$$\Rightarrow v = \frac{1}{x} \left[\frac{1}{4}x^2 + c \right] \Rightarrow y^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{x} \left[\frac{1}{4}x^2 + c \right].$$

(18) $xy'(x \sin y + y^{-1}) = 1$ denklemini çözümler. (Bernoulli)

Çözüm: $x \frac{dy}{dx} (x \sin y + \frac{1}{y}) = 1 \Rightarrow \frac{dx}{dy} - \frac{x}{y} = x^2 \sin y$

denklemin her iki tarafı da x^{-2} ile çarpılırsa

$$x^{-2} \frac{dx}{dy} - \frac{x^{-1}}{y} = \sin y, \quad v = x^{-1} \text{ olsun. } \frac{dv}{dy} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dy}$$

$$\left(\frac{dv}{dy} = -x^{-2} \frac{dx}{dy} \right)$$

$$\Rightarrow -\frac{dv}{dy} + \frac{1}{y}v = \sin y$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{dy} - \frac{1}{y}v = -\sin y \quad \text{lineer dif. denkleminin}$$

$$-\int \frac{1}{y} dy \left[\int -\sin y e^{\int -\frac{1}{y} dy} dy + c \right]$$

$$\Rightarrow v = e^{-\int \frac{1}{y} dy} \left[\int -\sin y e^{\int \frac{1}{y} dy} dy + c \right] \Rightarrow yx^{-1} = y \cos y - \sin y + c$$

(Kısmi int.)

(19) $x^2 y' - 2 \ln x - e^{\frac{2y+4 \ln x}{x}} = 0$ denklemini çözünüz. (Bernoulli)

Çözüm Denklemi $x^2 y' - 2 \ln x = e^{\frac{2y}{x}} \cdot e^{\frac{4 \ln x}{x}}$ olarak yazalım ve her iki tarafı x^2 'ye bölüp daha sonra e^{-2y} ile çarparsak

$$e^{-2y} y' - \frac{2 \ln x}{x^2} e^{-2y} = \frac{1}{x^2} e^{\frac{4 \ln x}{x}}$$

Bernoulli denlemi elde edilir.

$v = e^{-2y}$ dönüşümü ile $v' = -2e^{-2y} \cdot y'$ olur. Böylece

$$-\frac{v'}{2} - \frac{2 \ln x}{x^2} v = \frac{1}{x^2} e^{\frac{4 \ln x}{x}}$$

$$\Rightarrow v' + \frac{4 \ln x}{x^2} v = -\frac{2}{x^2} e^{\frac{4 \ln x}{x}}$$

lineer dif. denlemi elde edilir. Genl. çözümleri ise

$$v = e^{-4 \int \frac{\ln x}{x^2} dx} \left[\int \left(-\frac{2}{x^2} \right) e^{\frac{4 \ln x}{x}} \cdot e^{4 \int \frac{\ln x}{x^2} dx} dx + c \right]$$

$$= e^{4 \left(\frac{\ln x}{x} + \frac{1}{x} \right)} \left[\int \left(-\frac{2}{x^2} \right) \cdot e^{\frac{4 \ln x}{x}} \cdot e^{-4 \left(\frac{\ln x}{x} + \frac{1}{x} \right)} dx + c \right]$$

$$= e^{4 \left(\frac{\ln x}{x} + \frac{1}{x} \right)} \cdot \left[\int \left(-\frac{2}{x^2} \right) \cdot e^{-\frac{4}{x}} dx + c \right]$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -\frac{4}{x} = u \Rightarrow \frac{4}{x^2} dx = du \Rightarrow -\frac{2}{x^2} dx = -\frac{du}{2} \\ \left\{ -\frac{1}{2} \int e^u du = -\frac{1}{2} e^{-4/x} + c \right\} \end{array} \right.$$

$$= e^{4 \left(\frac{\ln x}{x} + \frac{1}{x} \right)} \cdot \left[-\frac{1}{2} e^{-4/x} + c \right] \text{ bulunur.}$$

Not : $\int \frac{\ln x}{x^2} dx = ?$ Kısmi int. uygulanırsa $\ln x = u$ $\frac{dx}{x^2} = du$ $\frac{dx}{x^2} = du$ $-\frac{1}{x} = u$

$$\int \frac{\ln x}{x^2} dx = uv - \int v du = -\frac{1}{x} \ln x + \int \frac{dx}{x^2}$$

$$= -\frac{1}{x} \ln x - \frac{1}{x} + c = -\left(\frac{\ln x + 1}{x} \right) + c$$

(20) $\frac{dy}{dx} + e^x - 3y + e^{-x} \cdot y^2 = 0$ denkleminin bir özel çözümünü

$y_1 = e^x$ olduğuna göre genel çözümünü bulunuz.

Çözüm: $y = y_1 + z = e^x + z$, $\frac{dy}{dx} = e^x + \frac{dz}{dx}$

denklemlerini verilen denkleme yerine yazarsak,

$$e^x + \frac{dz}{dx} + e^x - 3(e^x + z) + e^{-x} \cdot (e^x + z)^2 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dz}{dx} - z = -e^{-x} \cdot z^2$$

Bernoulli denklemini elde edilir. Bunun için denklemin her iki tarafını z^{-2} ile çarpalım.

$$z^{-2} \frac{dz}{dx} - z^{-1} = -e^{-x} \quad (*)$$

denklemini elde edilir. Buradan $v = z^{-1}$ denklemini

yapılırsa $\frac{dv}{dx} = \frac{dv}{dz} \frac{dz}{dx} = -z^{-2} \frac{dz}{dx}$

ifadesi elde edilir. Buradan

$$z^{-2} \frac{dz}{dx} = -\frac{dv}{dx} \quad \text{ifadesi ile } v = z^{-1}$$

bağıntısı $(*)$ eşitliğinde yerine yazılırsa

$$-\frac{dv}{dx} - v = -e^{-x}$$

linear denklemini elde edilir.

$$\Rightarrow \frac{dv}{dx} + v = e^{-x} \quad \text{lineer denklemini elde edilir}$$

Buradan

$$\Rightarrow v = e^{-x} (x+c)$$

$$\Rightarrow z^{-1} = e^{-x} (x+c) \Rightarrow z = e^x / (x+c)$$

$$\Rightarrow y = y_1 + z = e^x + \frac{e^x}{x+c} \quad \text{bulunur.}$$

(48)

(21) $y' - 2(x-1)y = -y^2 - x^2 + 2x + 1$ Riccati denk-

leminin bir özel çözümü $y_1 = x$ ise genel çözümü buluy.

Çözüm: $y = y_1 + \frac{1}{u} = x + \frac{1}{u}$, $y' = 1 - \frac{u'}{u^2}$

denklemlerin verilen denkleme yerine yazalım:

$$\left(1 - \frac{u'}{u^2}\right) - (2x-2)\left(x + \frac{1}{u}\right) = -\left(x + \frac{1}{u}\right)^2 - x^2 + 2x + 1$$

$$\Rightarrow -\frac{u'}{u^2} + \frac{2}{u} = -\frac{1}{u^2} \Rightarrow u' - 2u = 1$$

lineer denklemin elde edilir. Bunun çözümü

$$u = e^{\int 2dx} \left[\int 1 \cdot e^{-\int 2dx} dx + c \right]$$

$$u = -\frac{1}{2} + ce^{2x}$$

$$\Rightarrow y = x + \frac{1}{u} \quad \text{old.} \quad \frac{1}{y-x} = -\frac{1}{2} + ce^{2x}$$

$$\Rightarrow y-x = \frac{1}{-\frac{1}{2} + ce^{2x}}$$

$$\Rightarrow y = x + \frac{1}{-\frac{1}{2} + ce^{2x}}$$

genel çözümü bulunur.

BİRİNCİ MERTEBEDEN DİFERENSİYEL DENKLEMLERİN UYGULAMALARI1) Artma ve Azalma Problemleri

k orantı sabitini ve $N(t)$ sürekli fonksiyonu da artan veya azalan madde miktarını gösterebilir. Madde miktarının değişim hızı $\frac{dN}{dt}$ değerinin eldeki madde miktarına orantılı olduğunu kabul edersek o takdirde

$$\frac{dN}{dt} = kN \quad \text{veya} \quad \frac{dN}{dt} - kN = 0$$

denklemini geçerlidir.

ÖRNEK: Bir ülkenin nüfusunun o anda ülkede yaşayan insanların sayısıyla orantılı bir hızla arttığı biliniyor. Eğer nüfus 2 yıl sonra 2 katına çıkarsa ve 3 yıl sonra 20.000 ise başlangıçta ülkede kaç kişi yaşıyordu?

Çözüm: N : ülkede herhangi bir t anda yaşayan insan sayısı
 N_0 : başlangıçtaki insan sayısı

olsun.

$$\frac{dN}{dt} - kN = 0 \Rightarrow \int \frac{dN}{N} = \int k dt$$

$$\Rightarrow \ln N = kt + C_1 \Rightarrow N = e^{kt+C_1} \Rightarrow N = e^{C_1} \cdot e^{kt}$$

$$\Rightarrow \boxed{N = C e^{kt}} \quad \text{bulunur.}$$

$t=0$ anında başlangıçtaki sayı $N=N_0$ olsun.
 $N_0 = C \cdot e^0 \Rightarrow N_0 = C \Rightarrow \boxed{N = N_0 \cdot e^{kt}}$ bulunur.

$t=2$ için (2 yıl sonra) $N = 2N_0$ dir. (Şimdiki 2 katı oldu.)

$N = N_0 e^{kt}$ denkleminde yerine yazılınca

$$2N_0 = N_0 e^{k \cdot 2} \Rightarrow \ln 2 = \ln e^{k \cdot 2} \Rightarrow \ln 2 = 2k \Rightarrow$$

$$\Rightarrow k = \frac{\ln 2}{2} \approx \frac{0,693}{2} \approx 0,347$$

$$\Rightarrow 20000 = N_0 e^{(0,347) \cdot 3} \Rightarrow N_0 = \frac{20000}{(0,347) \cdot 3} = \boxed{7062} \quad \text{kişi}$$

2

ÖRNEK: Belirli bir radyoaktif maddenin, miktarı ile orantılı bir hızla yok olduğu bilinmektedir. Eğer başlangıçta 50 mg madde varsa ve 2 saat sonra maddenin başlangıçtaki kütlesinin % 10'unun yok olduğu gözlenmişse

- Herhangi bir t anında kalan madde kütlesi için bir ifade
- 4 saat sonra maddenin kütlesini
- Maddenin başlangıçtaki kütlesinin yarısına indiği zamanı bulunuz.

Gözünüz: a) N , herhangi bir t anındaki madde miktarı olsun.

$$\frac{dN}{dt} - kN = 0 \quad \text{olduğundan} \quad N = Ce^{kt} \quad \text{dir.}$$

$t = 0$ anında (yani başlangıçta) 50 gr madde olduğundan

$$t = 0 \text{ ve } N = 50 \text{ için} \quad 50 = Ce^{k \cdot 0} \Rightarrow \boxed{C = 50} \quad \text{dir.}$$

Böylece $N = 50e^{kt}$ bulunur.

$t = 2$ anında 50 mg'nin % 10'u yani 5 mg kaybolmuştur.

Yani $t = 2$ için $N = 50 - 5 = 45$ mg'dir.

$$\Rightarrow 45 = 50 \cdot e^{2k} \Rightarrow e^{2k} = \frac{9}{10} \Rightarrow \ln e^{2k} = \ln \frac{9}{10} \Rightarrow 2k = \ln \frac{9}{10}$$

bulunur. 0 halde

$$\Rightarrow k = \frac{1}{2} \ln(0,9) = -0,053$$

$$N = 50e^{kt} \Rightarrow \boxed{N = 50 \cdot e^{-0,053 \cdot t}}$$

matematiksel ifadesi bulunur.

$$b) \quad t = 4 \Rightarrow N = 50 \cdot e^{-0,053 \cdot 4} = 40,5 \text{ mg}$$

$$c) \quad N = \frac{50}{2} = 25$$

$$e^{-0,053t} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 25 = 50 \cdot e^{-0,053t} \Rightarrow \ln e^{-0,053t} = \ln \frac{1}{2} \Rightarrow -0,053t = -0,693$$

$$\Rightarrow t \approx 13 \text{ saat}$$

③

ÖRNEK: Bir baluteri kültürünün miktarı ile orantılı bir hızla arttığı biliniyor. 1 saat sonra kültürde 1000 baluteri lifi ve 4 saat sonra 3000 lif gözlemlenmiştir. Herhangi bir t anındaki kültürelüri yaluarık lif sayısını gösteren matematiksel ifade ve baarlangıçtaki kültür içindeki yaluarık lif sayısını bulunuz.

Gözünüz: $N : t$ anındaki kültürelüri lif sayısı

olsun.

$$\frac{dN}{dt} - kN = 0 \Rightarrow N = Ce^{kt}$$

$$t=1 \Rightarrow$$

$$1000 = C \cdot e^{k \cdot 1}$$

$$t=4 \Rightarrow$$

$$3000 = C \cdot e^{k \cdot 4}$$

$$1000 = C e^{k \cdot 1} \Rightarrow$$

$$1000 = C \cdot e^{0,366}$$

$$\Rightarrow N = C e^{kt} \Rightarrow N = 694 e^{0,366 t}$$

$$N_0 = 694 \text{ bulunur.}$$

$t=0$ anında (Baarlangıçtaki)

ÖRNEK: Bir baluteri, miktarı ile orantılı olarak artmaktadır. Baarlangıçta 2 doz baluteri vardır. 2 gün sonra ve bu 3 doz alınmıştır.

10 gün sonraki miktarı bulunuz.

$$\text{Gözünüz: } N = C e^{kt} \Rightarrow t=0 \text{ için } 2 = C e^{k \cdot 0} \Rightarrow C = 2 \text{ dir.}$$

$$2 \text{ gün sonra } N = 3 \text{ old.}$$

$$3 = 2 \cdot e^{2k} \Rightarrow$$

$$k = \frac{1}{2} \ln \frac{3}{2} \approx 0,2025 \text{ bulunur.}$$

$$10 \text{ gün sonraki miktar } N \text{ ise } t=10 \text{ için}$$

$$N = 2 \cdot e^{0,2025 \cdot 10} \approx 15,19 \text{ doz.}$$

④ ÖRNEK: Bir salgın hastalık teorisine göre hasta nüfusun değişim hızı, hastalığı yakalanmış nüfus ile hasta olmayanların sayısının çarpımı ile orantılıdır. Bu teoriyi kontrol etmek için 500 tane farenin 5'ine hastalık bulaştırılmıştır. Teorinin doğru olduğu varsayılrsa farelerin yarısının hasta olması için ne kadar zaman yeter?

Çözüm: "N: t anındaki hasta fare sayısı" olsun.

$N_0 = 5$ başlangıçtaki hasta fare sayısı

$500 - N$: Hasta olmayan fare sayısı

Hasta nüfusun değişim hızı, hasta ve hasta olmayanların sayısının çarpımı olduğundan

$$\frac{dN}{dt} - k \cdot N \cdot (500 - N) = 0$$

yazılabilir. (Burada değişim hızı sadece hasta sayısı ile orantılı değildir.)

$$\frac{dN}{N \cdot (500 - N)} - k dt = 0 \Rightarrow \frac{1}{N(500 - N)} = \frac{A}{N} + \frac{B}{500 - N} \Rightarrow A = \frac{1}{500} = B.$$

$$\Rightarrow \int \left(\frac{\frac{1}{500}}{N} + \frac{\frac{1}{500}}{500 - N} \right) dN - \int k dt = C_1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{500} (\ln N - \ln(500 - N)) - k t = C_1$$

$$\Rightarrow \frac{N}{500 - N} = e^{\frac{500(C_1 + kt)}{500 - N}} = C e^{500kt} \text{ bulunur.}$$

$t = 0$ için $N = 5$ verildiğinden

$$\frac{5}{495} = C e^{500 \cdot 0} \Rightarrow C = \frac{1}{99}$$

$$\Rightarrow \frac{N}{500 - N} = \frac{1}{99} \cdot e^{500kt} \Rightarrow N = 250 \text{ için } t = ?$$

$$\Rightarrow \frac{250}{500 - 250} = \frac{1}{99} \cdot e^{500kt} \Rightarrow \ln 99 = 500kt$$

$$\Rightarrow t = \frac{\ln 99}{500k}$$

Not: Soruda k'yı bulabilecekle kadar veri olmadığı için sonucu k'ya bağlı bırakıyoruz.

5

2) Sıcaklık Problemleri

Newton'un soğuma yasası, bir cismin sıcaklığının zamanla değişim hızının, cisimle onu çevreleyen ortam arasındaki sıcaklık farkına orantılı olduğunu ifade eder. T cismin sıcaklığını, T_g de çevreleyen ortamın sıcaklığını gösterebilir. O zaman cismin sıcaklığının zamanla değişim hızı $\frac{dT}{dt}$ olur. Newton'un soğuma yasası

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_g) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{dT}{dt} + kT = kT_g$$

Burada k orantı sabitidir. Newton yasasında, T nin T_g 'den büyük olduğu bir soğuma sürecinde $\frac{dT}{dt}$ yi negatif yapmak ve T nin T_g 'den küçük olduğu bir ısınma probleminde ise $\frac{dT}{dt}$ yi pozitif yapmak için k yi negatif seçmek gerekir.

ÖRNEK: 100°F sıcaklıktaki bir metal kubuk sabit 0°F sıcaklıktaki bir odaya yerleştiriliyor. Eğer 20 dak. sonra sıcaklık 50°F ise

- a) Kubuk 25°F 'ye ne kadar sürede düşer?
- b) 10 dak. sonraki sıcaklığı bulunuz.

ÇÖZÜM: $T_g = 0$ verilmiş. Bu nedenle

$$\Rightarrow \frac{dT}{dt} + kT = 0 \Rightarrow \frac{dT}{T} = -\frac{kT}{T} dt$$

$$\Rightarrow \frac{dT}{T} = -k dt \Rightarrow \ln T = -kt + C_1$$

$$\Rightarrow T = e^{-kt + C_1} = e^{-kt} \cdot e^{C_1} = C \cdot e^{-kt}$$

6)

$t=0$ anında $T=100$ olduğundan

$$100 = C \cdot e^{-kt} \Rightarrow C = 100$$

bulunur. Böylece $T = 100 \cdot e^{-kt}$ olur.

$t=20$ anında $T=50$ olduğundan

$$50 = 100 e^{-20k} \Rightarrow \frac{1}{2} = e^{-20k} \Rightarrow k = 0,035$$

$\Rightarrow T = 100 \cdot e^{-0,035 \cdot t}$ matematiksel ifadesi bulunur.

Buna göre

$$a) T=25 \text{ ise } 25 = 100 \cdot e^{-0,035 \cdot t}$$

$$\Rightarrow -0,035 t = \ln \frac{1}{4} \Rightarrow t = 39,6 \text{ dak. bulunur.}$$

b) $t=10$ için $T=?$

$$T = 100 \cdot e^{-0,035 \cdot 10} = 70,5^\circ F$$

bulunur.

ÖRNEK : $50^\circ F$ sıcaklığına bir cisim, sıcaklığı $100^\circ F$ olan bir ortama yerleştirilmiştir. Eğer 5 dak. sonra cismin sıcaklığı $60^\circ F$ ise

a) Cismin $75^\circ F$ sıcaklığa ulaşması için gereken

zamanı

b) 20 dak. sonraki sıcaklığı bulunuz.

Gözlem : a) $T_0 = 100$ verilmiş.

$$\frac{dT}{dt} + kT = 100k \Rightarrow T = Ce^{-kt} + 100 \text{ olur.}$$

$t=0$ için $T=50$ verildiğinden

(7)

$$50 = C e^{-k \cdot 0} + 100 \Rightarrow C = -50$$

$$\Rightarrow \boxed{T = -50 \cdot e^{-kt} + 100} \text{ bulunur.}$$

$t = 5$ anında $T = 60^\circ\text{F}$ olduğundan

$$60 = -50 \cdot e^{-5k} + 100 \Rightarrow e^{-5k} = \frac{4}{5}$$

$$\Rightarrow -5k = \ln \frac{4}{5} \Rightarrow k = 0,045 \text{ olup}$$

$$\boxed{T = -50 \cdot e^{-0,045t} + 100}$$

matematiksel ifadesi bulunur.

$-0,045t$

$$a) T = 75^\circ\text{F} \Rightarrow 75 = -50 \cdot e^{-0,045t} + 100$$

$$\Rightarrow e^{-0,045t} = \frac{1}{2} \Rightarrow -0,045t = \ln \frac{1}{2} \Rightarrow t = 15,4 \text{ dak.}$$

$$b) t = 20 \text{ ise } T = ?$$

$$T = -50 \cdot e^{-0,045 \cdot 20} + 100 = 79,5^\circ\text{F} \text{ bulunur.}$$

ÖRNEK: Suyun 100°C 'de kaynadığı ve sürgünken ilk 20 dakikada sıcaklığın 10°C düştüğü bilinmektedir.

- Qeyre sıcaklığı 0°C olan bir kazandaki suyun sıcaklığının zamanla değişimini veren bağıntısı bulunur.
- Kazandaki su sıcaklığının 90°C 'den 80°C 'ye düşmesi için geçen süreyi bulunuz.
- 90 dak. sonra kazandaki su sıcaklığının kaç $^\circ\text{C}$ olacağını hesaplayınız.

Çözümü:

a) $T_0 = 0$ olarak verildiğine göre denklemin

$$\frac{dT}{dt} + kT = 0 \Rightarrow T = \underbrace{100 e^{-kt}}_{\text{dir...}} \text{ dir...}$$

($t=0$ anında $T=100$ verildiğinden $C=100$ bulunur) 55
(İlk örnekten)

(8)

Su ilk 20 dakikada 10°C soğuduğundan karandaki su sıcaklığı $T = 100 - 10 = 90^{\circ}\text{C}$ olur. Bu durumda

$$90 = 100 e^{-k \cdot 20} \Rightarrow k = +0,005$$

bulunur. Buradan

$$T = 100 e^{-0,005t}$$

bağıntısı elde edilir.

b) $T = 80$ alırsa, suyun 100°C 'den 80°C 'ye düşmesi için geçen zaman

$$80 = 100 e^{-0,005t} \Rightarrow t = 44,6 \text{ dak.}$$

olarak bulunur. Suyun 100°C 'den 90°C 'ye düşmesi için geçen süre 20 dak. olduğuna göre suyun 90°C 'den 80°C 'ye düşmesi için geçen zaman $44,6 - 20 = 24,6$ dakika olur.

c) $t = 90$ dak. sonra su sıcaklığı

$$T = 100 \cdot e^{-0,005 \cdot 90} \Rightarrow T = 63,8^{\circ}\text{C}$$

olarak elde edilir.

3) Seyretive Problemleri

Başlangıçta içinde "a" lb tuz içeren V_0 galon tuzlu su çözeltisi olan bir tanka değiştirilmiştir. Galon başına "b" lb tuz içeren bir başka çözelti tanka "e" gal/dak hızla dökülüyor ve aynı zamanda karıştırılmış çözelti tanktan "f" gal/dak hızla boşaltılıyor. Problem, herhangi bir t anında tanktaki tuz miktarını bulmaktır. Buna göre tuz miktarını veren denklemi

$$\frac{dQ}{dt} + \frac{f}{V_0 + (e-f)t} \cdot Q = b \cdot e$$

Herhangi bir t anında tanktaki çözeltinin hacmi $V_0 + (e-f)t$ dir.

şeklinde dir. (Q, herhangi bir anda tanktaki tuz miktarıdır) (Q=0 başlangıçta tanktaki tuz miktarıdır) ($Q_0 = a$)

ÖRNEK: Bir tankta başlangıçta 20 lb tuz içeren 100 gal bir çözelti vardır. $t=0$ anında tanka 5 gal/dak hızla saf su dökülmeye başlanıyor, aynı zamanda iyi karıştırılan karışım tanktan aynı hızla boşaltılıyor. Herhangi bir t anında tanktaki tuz miktarını bulunuz.

Çözümü: $a=20$ lb, $V_0=100$ gal, $b=0$ lb (saf su old.)
 $e=5$ ve $f=5$ gal/dak

$$\frac{dQ}{dt} + \frac{5}{100 + (5-5)t} \cdot Q = 0.5 \Rightarrow \frac{dQ}{dt} + \frac{1}{20} Q = 0$$

lineer denklemi bulunur. Bu denklemin çözümünü $Q = C e^{-t/20}$ dir. $t=0$ anında $Q = a = 20$ verilmiş. Bu değerleri yorarak

$$20 = C e^{-0/20} \Rightarrow C = 20 \text{ bulunur.}$$

Böylece $Q = 20 \cdot e^{-t/20}$ bulunur.

(10)

ÖRNEK: Bir tankta boyolmuşta 1 lb tuz içeren 100 gal tuzlu çözelti vardır. $t=0$ anında tankta, galın başına 1 lb tuz içeren bir başka çözelti 3 gal/dak hızla dökülmeye başlanıyor, aynı zamanda iyi karıştırılan karışım tanktan aynı hızla boşaltılıyor.

a) Herhangi bir t anında tanktaki tuz miktarını

b) tanktaki karışımın 2 lb tuz bulunduğu zamanı bulunuz.

← (galin başına 1 lb tuz içeren başka çözelti)

Çözümü: a) $a=1$, $v_0=100$, $b=1$, $e=f=3$ gal/dak.

$$\frac{dQ}{dt} + \frac{3}{100 + (3-1)t} Q = 1 \cdot 3 \Rightarrow \frac{dQ}{dt} + 0,03Q = 3$$

$$\Rightarrow Q = C \cdot e^{-0,03t} + 100 \quad \text{ifadesi bulunur.}$$

$t=0$ anında $Q = a = 1$ verildiğinden

$$1 = C \cdot e^{-0,03 \cdot 0} + 100 \Rightarrow C = -99 \quad \text{ve böylece}$$

$$Q = -99 \cdot e^{-0,03t} + 100$$

bulunur.

b) $Q=2$ olduğunda $t=?$

$$2 = -99 \cdot e^{-0,03t} + 100 \Rightarrow e^{-0,03t} = \frac{98}{99}$$

$$\Rightarrow t = -\frac{1}{0,03} \ln \frac{98}{99}$$

$$\Rightarrow t \approx 0,34 \text{ dakika bulunur.}$$

(11)

ÖRNEK : 50 galonluk bir tankta 10 galon saf su vardır.

$t=0$ anında galon başına 1 lb tuz içeren bir çözelti 4 gal/dak hızla tanka sürekliye başlanıyor aynı zamanda iyi karıştırılan karışım, tanktan 2 gal/dak hızla boşaltılıyor.

a) Tankın tasacağı zamanı

b) Tazma anında tanktaki tuz miktarını bulunuz.

(Çözüm : a) $a=0$ (Tankta başlangıçta sadece saf su olduğundan tuz miktarı sıfırdır.)

$$b=1, \quad e=4, \quad f=2 \quad \text{ve} \quad v_0=10 \text{ dur.}$$

Herhangi bir t anında tanktaki çözeltinin hacmi

$$v_0 + et - ft = 10 + 2t \text{ olarak verilir.}$$

$$10 + 2t = 50 \Rightarrow t = 20 \text{ dak bulunur.}$$

← (t kadar süre sonra tankta 50 gal su olmalı.)

$$b) \quad \frac{dQ}{dt} + \frac{2}{10+2t} Q = 1.4$$

$$\text{denkleminin çözümleri} \quad -\int \frac{2}{10+2t} dt \left[\int 4 e^{\int \frac{2}{10+2t} dt + C} \right]$$

$$Q = e^{\int \frac{2}{10+2t} dt} \left[\int 4 e^{-\int \frac{2}{10+2t} dt} dt + C \right]$$

$$\Rightarrow Q = \frac{40t + 4t^2 + C}{10+2t}$$

bulunur. $t=0$ 'da $Q=a=0$ verildiğinden

bulunur.

$$0 = \frac{40 \cdot 0 + 4 \cdot 0^2 + C}{10+2 \cdot 0} \Rightarrow C=0$$

Tazma olduğunda Q 'yu arıyoruz ki bu an (a) çözümlerinden

$t=20$ 'dır. Böylece

$$Q = \frac{40 \cdot 20 + 4 \cdot 20^2}{10 + 2 \cdot 20} = 48 \text{ lb.}$$

bulunur.

(12)


4) Serbest Düşüş Problemleri

Sadece g yer çekimi ve cismin hızıyla orantılı hava direncinin etkisinde dikey olarak düşen m kütleli bir cismi göz önüne alalım. Burada yer çekimi ve hızın sabit kaldığı ve uygunluk için aşağı yön pozitif kabul edilebilir.

" F " cisme t anında etki eden net kuvvet ve " v " cism t anındaki hız olmalı üzere elimizdeki problemde cisme etkiyen iki kuvvet vardır:

- (1) yer çekiminden doğan, cism m "ağırlığı ile verilen ve " mg "'ye eşit olan kuvvet
- (2) hava direncinden doğan, $k > 0$ bir orantı sabiti olmalı üzere, $-kv$ ile verilen kuvvettir. (Bu kuvvet hızla karşı old. negatiftir)

Sonuçta cism t anındaki net kuvvet $F = mg - kv$ dir.

$$F = m \frac{dv}{dt} \quad \text{formülünde yerine yazarsak}$$


$$mg - kv = m \frac{dv}{dt} \quad (3.1)$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{dt} + \frac{k}{m} v = g \quad \dots \dots \dots (3.1)$$

olarak elde edilir. Eğer hava direnci ihmal edilirse veya

yoksa $k = 0$ old.

$$\frac{dv}{dt} = g \quad \dots \dots \dots (3.2)$$

olar. Burada m , cism m hızla, g ise yerçekimi kuvvetidir.

Uyarı : (3.1) ve (3.2) denklemleri sadece verilen koşullar sağlandığı zaman geçerlidir. Bu denklemler, örneğin, eğer hava direnci hızla değil, hızın karesi ile orantılı ise veya yukarı yön pozitif seçilmeye geçerse geçerli değildir.

Limit Hız : Dikey olarak düşen bir cisme etkiyen hava direnci kuvvetiyle yer çekimi kuvvetinin eşit olduğu anda cism t sabit hale gelir. Bu hız limit hızdır. Yani cism t ulaşacağı en yüksek hızdır.

$$v_L = \frac{mg}{k} \quad (k > 0)$$

ÖRNEK: 5 lb kütleli bir cisim, 100 ft yükseklikten ⁽¹³⁾ sıfır ilk hızla düşürülüyor. Hava direnci olmadığını kabul ederek

- Herhangi bir t anında cismin hızının ifadesini,
- Herhangi bir t anında cismin konumunun ifadesini,
- yere ulaşması için gereken zamanı bulunuz.

Çözüm:

a) Hava direnci olmadığından $\frac{dv}{dt} = g$ 'dır. Bu denklemin her iki tarafını t ile çarparsak

$$v = gt + C$$

dir. $t=0$ iken $v=0$ dir. (Cismin ilk hızı sıfırdır).

Buradan $0 = g \cdot 0 + C \Rightarrow C = 0$ olur. ve böylece

$$v = gt$$

bulunur. $g = 32 \text{ ft/s}^2$ kabul edilirse $v = 32t$ bulunur.

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ ft} \approx 0,30 \text{ m} \\ g = 9,8 \text{ m/s}^2 \end{array} \right\}$$

b) $v = \frac{dx}{dt} \Rightarrow \frac{dx}{dt} = 32t$ dir. Bu denklemin çözümünü

$$x = 16t^2 + C_1 \text{ şeklinde yazılır.}$$

Ancak $t=0$ 'da $x=0$ dir. Böylece

$$0 = 16 \cdot 0^2 + C_1 \Rightarrow C_1 = 0 \text{ olur. Buradan}$$

$$x = 16t^2 \text{ elde edilir.}$$

c) $x=100$ iken $t=?$.

$$t = \sqrt{\frac{100}{16}} = 2,5 \text{ sn bulunur.}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x = 16t^2 \\ \Rightarrow t = \sqrt{\frac{x}{16}} \end{array} \right\}$$

ÖRNEK : 2 lb kütleli bir cisim, sıfır ilk hızıyla bırakılıyor ve hızının karesi ile orantılı bir hava direncinin etkisinde kalıyor. Herhangi bir t anında cismin hızının ifadesini bulunuz.

Çözüm : Hava direncinden oluşan $-kv^2$ dir. Bu nedenle

$$mg - kv^2 = m \frac{dv}{dt} \Rightarrow 2 \frac{dv}{dt} = 64 - kv^2 \text{ dir.}$$

Denklemi düzenleriz

$$\frac{2}{64 - kv^2} dv - dt = 0$$

denklemi elde edilir. Basit kesirler yardımıyla

$$\frac{2}{64 - kv^2} = \frac{2}{(8 - \sqrt{2}v)(8 + \sqrt{2}v)} = \frac{\frac{1}{8}}{8 - \sqrt{2}v} + \frac{\frac{1}{8}}{8 + \sqrt{2}v}$$

olar. Buradan

$$\frac{1}{8} \left(\frac{1}{8 - \sqrt{2}v} + \frac{1}{8 + \sqrt{2}v} \right) dv - dt = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{8} \int \left(\frac{1}{8 - \sqrt{2}v} + \frac{1}{8 + \sqrt{2}v} \right) dv - \int dt = C$$

$$\Rightarrow \frac{1}{8} \left[-\frac{1}{\sqrt{2}} \ln |8 - \sqrt{2}v| + \frac{1}{\sqrt{2}} \ln |8 + \sqrt{2}v| \right] - t = C$$

$$\Rightarrow \frac{8 + \sqrt{2}v}{8 - \sqrt{2}v} = C_1 e^{\frac{8\sqrt{2}t}{8}} \quad (C_1 = \pm e^{8\sqrt{2}C})$$

olarak yazılabilir. $t=0$ da $v=0$ verildiğinden $C_1 = 1$ bulunur ve hız

$$\frac{8 + \sqrt{2}v}{8 - \sqrt{2}v} = e^{\frac{8\sqrt{2}t}{8}} \Rightarrow v = \frac{e^{\frac{8\sqrt{2}t}{8}} - 8}{\sqrt{2} + e^{\frac{8\sqrt{2}t}{8}}}$$

şeklinde dir.

18

ÖRNEK: 64 lb ağırlığında bir cisim 10 ft/sn ilk hızla 100 ft yükseklikten atılıyor. Hava direncinin cismin hızı ile orantılı olduğunu kabul edelim. Eğer limit hızın 128 ft/sn olduğu biliniyorsa

- Herhangi bir t anında cismin hızının ifadesini
- Herhangi bir t anında cismin konumunun ifadesini bulunuz. $\{ 1 \text{ lb} = 0,45 \text{ kg}, 1 \text{ slug} = 14,6 \text{ kg} \}$

Çözüm:

a) Burada $w = 64 \text{ lb}$, $w = mg$ olduğundan $mg = 64 \Rightarrow m \cdot 32 = 64 \Rightarrow m = 2 \text{ slug}$ bulunur.

$v_e = 128 \text{ ft/sn}$ verildiğinden $128 = \frac{64}{k} \Rightarrow k = \frac{1}{2} \text{ 1/s}$

Bu değerleri (3.1) formülünde yerine yazarsak

$$\frac{dv}{dt} + \frac{1}{4}v = 32$$

lineer dif. denklemi elde edilir. Bunun çözümü ise

$$v = ce^{-\frac{t}{4}} + 128$$

bulunur. $t=0$ 'da $v=10$ verildiğinden

$$10 = ce^{-\frac{0}{4}} + 128 \Rightarrow c = -118 \text{ bulunur.}$$

Herhangi bir t anındaki hız

$$v = -118 \cdot e^{-\frac{t}{4}} + 128$$

ile verilir.

b) x yer değişimine olma üzere $v = \frac{dx}{dt}$

$$\frac{dx}{dt} = v \Rightarrow \frac{dx}{dt} = -118 \cdot e^{-\frac{t}{4}} + 128$$

yanılabılır. Buradan $x = 472 \cdot e^{-\frac{t}{4}} + 128t + c_1$ bulunur. $t=0$ 'da $x=0$ old. $c_1 = -472$ ve böylece $x = 472 \cdot e^{-\frac{t}{4}} + 128t - 472$ dir.

ÖRNEK : m kütleli bir cisim, v_0 ilk hızıyla yukarı doğru diley (16) olarak fırlatılıyor. Eger cisim, hızıyla orantılı bir hava direncinin etkisinde ise

- Hareketin denklemini
- Herhangi bir t anındaki hızın ifadesini
- Cismin maksimum yüksekliğe ulaşması için gereken zamanı bulunuz.

Çözüm : a) Cisim üzerinde iki kuvvet cismin hızına karşı ko-yacaktır. Bu kuvvetler mg yer çekimi ve $k v$ hava direnci kuvveti dir. Her ikisi de aşağı doğru ve negatif yönde hareket ettikten cismin üzerindeki net kuvvet $-mg - k v$ dir. Böylece

$$m \frac{dv}{dt} = -mg - k v \Rightarrow \frac{dv}{dt} + \frac{k}{m} v = -g \dots (*)$$

denklemi bulunur.

- denklemi lineerdir ve çözümü

$$v = c e^{-\frac{k}{m}t} - \frac{mg}{k}$$

dir. $t=0$ da $v = v_0$ dir. Buradan $v_0 = c - \frac{mg}{k} \Rightarrow c = v_0 + \frac{mg}{k}$ olur.

Herhangi bir t anında cismin hızı

$$v = \left(v_0 + \frac{mg}{k} \right) \cdot e^{-\frac{k}{m}t} - \frac{mg}{k} \dots (*)$$

olarak bulunur.


- cisim $v=0$ olduğunda maksimum yüksekliğe çıkar. Böylece $v=0$ iken t 'yi arıyoruz. (*) da $v=0$ yardımı

$$0 = \left(v_0 + \frac{mg}{k} \right) e^{-\frac{k}{m}t} - \frac{mg}{k} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow e^{-\frac{k}{m}t} = \frac{1}{1 + \frac{v_0 k}{mg}} \Rightarrow -\frac{k}{m}t = \ln \left(\frac{1}{1 + \frac{v_0 k}{mg}} \right)$$

$$\Rightarrow t = \frac{m}{k} \ln \left(1 + \frac{v_0 k}{mg} \right)$$

elde edilir.



(17)

5) Elektrik Devreleri

Bir R direnci (ohm), bir L indüktörü (henry) ve bir elektromotiv kaynak (emf) E (Volt)'den oluşan basit bir RL devresinde I akım miktarını veren temel denklemler

$$\frac{dI}{dt} + \frac{R}{L} I = \frac{E}{L} \quad (\text{Şekil 1})$$


dir. Bir direnç, bir C sigacı (farad) ve bir emf'den oluşan ve indüktans içermeyen bir RC devresi için sigaç üzerindeki q elektriksel yükünü (coulomb) veren denklemler

$$\frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC} q = \frac{E}{R} \quad (\text{Şekil 2})$$


olur. q ve I arasındaki bağıntı ise

$$I = \frac{dq}{dt}$$

ile verilir.



Şekil 1



Şekil 2

ÖRNEK: Bir RL devresinde 5 volt emf, 50 ohm direnç ve 1 henry indüktans vardır. İlk akım sıfır ise herhangi bir t anında devredeki akımı bulunuz.

Çözüm: Burada $E=5$, $R=50$ ve $L=1$ dir. Buradan

$$\frac{dI}{dt} + 50I = 5 \Rightarrow I = ce^{-50t} + \frac{1}{10} \text{ bulunur.}$$

$$t=0 \text{ 'da } I=0 \text{ verildiğinden } 0 = ce^{-50 \cdot 0} + \frac{1}{10} \Rightarrow c = -\frac{1}{10}$$

olup herhangi bir t anındaki akım $I = -\frac{1}{10} e^{-50t} + \frac{1}{10}$ olur.

(18)

ÖRNEK : Bir RC devresinde emf (volt) $400 \cos 2t$, direnç 100 ohm ve sigorta 10^{-2} farad olarak veriliyor. Başlangıçta sigorta üzerinde hiç yük yoktur. Herhangi bir t anındaki akımı bulunuz.

Çözüm : Önce q yükünü bulup sonra akımı bulalım. Burada $\mathcal{E} = 400 \cos 2t$, $R = 100$ ve $C = 10^{-2}$ dir.

Böylece
$$\frac{dq}{dt} + q = 4 \cos 2t$$

dur. Bu denklemin lineardir ve çözümü

$$q = ce^{-t} + \frac{8}{5} \sin 2t + \frac{4}{5} \cos 2t$$

bulunmaktadır. $t=0$ 'da $q=0$ verildiğinden

$$0 = ce^{-0} + \frac{8}{5} \sin 2 \cdot 0 + \frac{4}{5} \cos 2 \cdot 0$$

$$\Rightarrow c = -\frac{4}{5}$$

$$\Rightarrow q = -\frac{4}{5} e^{-t} + \frac{8}{5} \sin 2t + \frac{4}{5} \cos 2t$$

bulunur. $I = \frac{dq}{dt}$ olduğundan

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{4}{5} e^{-t} + \frac{16}{5} \cos 2t - \frac{8}{5} \sin 2t$$

elde edilir.

4. BÖLÜM

①

YÜKSEK MERTEBEDEN LİNEER DİFERENSİYEL DENKLEMLER

3.1. Giriş :

n -yinci mertebeden bir lineer dif. denklemler

$$b_n(x) \cdot y^{(n)} + b_{n-1}(x) \cdot y^{(n-1)} + \dots + b_2(x) \cdot y'' + b_1(x) \cdot y' + b_0(x) \cdot y = g(x) \dots (4.1)$$

biçimindedir. Burada $g(x)$ ve $b_j(x)$ ($j=0,1,2,\dots,n$) katsayıları sadece x değişkenine bağlıdır. Bir başka deyişle y' ye veya y nin herhangi bir türevine bağlı değildir.

Eğer $g(x) \equiv 0$ ise o zaman (4.1) denklemini homojendir. Aksi durumda homojen değildir. Eğer (4.1)'deki tüm $b_j(x)$ katsayıları sabitse bir lineer dif. denklemler sabit katsayılıdır. Eğer bu katsayılardan biri veya daha fazlası sabit değilse (4.1) denklemini değişken katsayılıdır.

Şimdi (4.1) lineer dif. denklemini ve aşağıdaki n tane bağımlı koşulu ile verilen bağımlı- değer problemini düşünelim:

$$y(x_0) = c_0, \quad y'(x_0) = c_1, \quad y''(x_0) = c_2, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = c_{n-1} \dots (4.2)$$

Eğer $g(x)$ ve $b_j(x)$ ($j=0,1,2,\dots,n$) fonksiyonları x_0 'ı içeren bir I aralığında sürekli ise ve I 'da $b_n(x) \neq 0$ ise o zaman (4.1) ve (4.2) ile verilen bağımlı- değer probleminin I 'da tanımlı tek bir çözümü vardır.

$b_n(x) \neq 0$ olmak üzere (4.1) denklemini $b_n(x)$ ile bö-

lürürse

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x) \cdot y^{(n-1)} + \dots + a_2(x) \cdot y'' + a_1(x) \cdot y' + a_0(x) \cdot y = \phi(x) \dots (4.3)$$

bulunur.

$L(y)$ operatörünü, $a_i(x)$ ($i=0,1,2,\dots,n-1$) fonksiyonları

verilen aralıktaki sürekli olma ile ilgili

(2)

$L(y) \equiv y^{(n)} + a_{n-1}(x)y' + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y \dots (4.4)$

ile tanımlayalım. 0 zaman (4.3) denklemleri

$$L(y) = \phi(x) \dots \dots \dots (4.5)$$

olarak yazılabilir ve özel durumda bir lineer homojen denklemin

$$L(y) = 0 \dots \dots \dots (4.6)$$

halinde ifade edilebilir.

TANIM: (Lineer bağımlılık ve lineer bağımsızlık):

Bir $\{y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)\}$ fonksiyon kümesi verilsin.

Eğer $x \in [a, b]$ için

$$c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_n y_n(x) = 0 \dots \dots \dots (4.7)$$

esitliğini sağlayan $c_1, c_2, \dots, c_n$ lerin hepsi sıfır değilse

$\{y_1(x), \dots, y_n(x)\}$ fonksiyon kümesi $[a, b]$ aralığı üzerinde

lineer bağımlıdır.

ÖRNEK: $\{x, 5x, 1, \sin x\}$ kümesi $[-1, 1]$ üzerinde lineer bağımlıdır, çünkü

$$c_1 x + c_2 5x + c_3 \cdot 1 + c_4 \sin x = 0$$

esitliğini sağlayacak şekilde $c_1 = -5, c_2 = 1, c_3 = 0$ ve $c_4 = 0$

sabitleri vardır. $\square$

Eğer (4.7) esitliğinin sağlanması yalnızca $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$ olması halinde oluyorsa $\{y_1(x), \dots, y_n(x)\}$ fonksiyonlar kümesi $[a, b]$ aralığında lineer bağımsızdır.

9.2. LINEER DİFERENSİYEL DENKLEMLERİN TEMEL TEOREMİ

TEOREM n -yüncü mertebeden lineer homojen $L(y) = 0$ diferansiyel denkleminin birbirinden farklı n tane çözümünü $y_1, y_2, \dots, y_m$ olsun. ($m \leq n$). Bu durumda $c_1, c_2, \dots, c_m$

③

katsayıları keyfi sabit sayılar olma üzere,

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_m y_m$$

fonksiyonu da aynı denklemin bir çözümü olur.

TANIM : (Lineer kombinasyon) : $y_1, y_2, \dots, y_m$ herhangi m tane fonksiyon ve $c_1, c_2, \dots, c_m$ herhangi keyfi sabit sayılar olsun. Bu durumda

$$c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_m y_m$$

ifadesine $y_1, y_2, \dots, y_m$ fonksiyonlarının lineer kombinasyonu denir.

Bu tanımdan yararlanarak yukarıdaki teoremi şöyle de ifade edilebilir : " Bir lineer homojen dif. denklemin çözümlerinin lineer kombinasyonu da bir çözümdür ". Bu teoremi, lineer homojen dif. denklemlerin Temel Teoremidir.

TANIM (wronskian Determinantı) : $y_1, y_2, \dots, y_n$ gibi

n tane fonksiyon verilsin ve bu fonksiyonlar her $x \in [a, b]$ için $(n-1)$ -yinci mertebeden türene sahip olsun.

Bu durumda $y_1, y_2, \dots, y_n$ fonksiyonlarının wronskian,

$$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ y_1' & y_2' & \dots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

determinantıdır.

Eğer bu determinant sıfıra eşitse $y_1, y_2, \dots, y_n$ fonksiyonları lineer bağımlı olur, sıfırdan farklıysa lineer bağımsızdır.

(4)

Eğer $y_1, y_2, \dots, y_n$ fonksiyonlarının herbiri

$$b_n(x)y^{(n)} + b_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + b_1(x)y' + b_0(x)y = 0 \quad (4.8)$$

denklemin birer çözümü ise ve bu fonksiyonlar aynı zamanda kendi aralarında lineer bağımsız iseler bunların lineer kombinasyonu olan

$$y_h = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_n y_n \quad (4.9)$$

fonksiyonu da aynı denklemin bir çözümüdür.

(4.9) ile verilen y_h fonksiyonu verilen homojen denklemin genel çözümü veya homojen çözümdür. Halbuki amacımız sadece (4.8) denkleminin genel çözümünü bulmaktır. Bulmak değil (4.1) denkleminin genel çözümünü bulmaktır. Bunun için değişik metodlar geliştirilmiş ve böylece (4.1) denkleminin bir özel çözümü olan y_p bulunabilmiştir. Ayrıca ifade edelim ki, y_h çözümü (4.8) denkleminin mertebe besine eşit sayıda keyfi sabit sayı içeren bir halde, y_p çözümünü herhangi bir sabit sayı içermez. Sonuç olarak $y = y_h + y_p$ fonksiyonu (4.1) denkleminin genel çözümüdür.

Öyleyse, homojen olmayan bir dif. denklemin genel çözümünü bulmak için önce denklemin homojen kısmının y_h homojen çözümünü bulmak, sonra denklemin y_p özel çözümünü bulmak ve sonunda bunları toplayıp $y = y_h + y_p$ şeklinde yazmak gerekmektedir.

ÖRNEK : $\{\sin 3X, \cos 3X\}$ kümesinin wronskianı bulunuz. (5)

Çözüm :

$$W = \begin{vmatrix} \sin 3X & \cos 3X \\ (\sin 3X)' & (\cos 3X)' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sin 3X & \cos 3X \\ 3\cos 3X & -3\sin 3X \end{vmatrix}$$

$$= -3\sin^2 3X - 3\cos^2 3X = -3(\sin^2 3X + \cos^2 3X) = -3$$

ÖRNEK : $\{X, X^2, X^3\}$ kümesinin wronskianını bulunuz.

Çözüm :

$$W = \begin{vmatrix} X & X^2 & X^3 \\ (X^2)' & (X^3)' & (X^3)' \\ (X^2)'' & (X^3)'' & (X^3)'' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} X & X^2 & X^3 \\ 2X & 3X^2 & 3X^2 \\ 0 & 2 & 6X \end{vmatrix} = 2X^3$$

ÖRNEK : $y'' + y = 0$ denkleminin iki çözümünden $y_1 = \sin 3X$ ve $y_2 = \cos 2X$ olduğu bilgisiyle genel çözümü bulunuz.

Çözüm : y_1 ve y_2 nin wronskianı -3 tür ve sıfırdan farklıdır. 0 halde lineer bağımsız olduğundan verilen denklemin genel çözümü

$$y = c_1 \sin 3X + c_2 \cos 2X$$

olur.

ÖRNEK : $y'' - 2y' + y = 0$ denkleminin iki çözümü e^{-X} ve $5e^{-X}$ tir. Genel çözüm $y = c_1 e^{-X} + c_2 5e^{-X}$ midir ?

Çözüm :

$$W = \begin{vmatrix} e^{-X} & 5e^{-X} \\ (e^{-X})' & (5e^{-X})' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^{-X} & 5e^{-X} \\ -e^{-X} & -5e^{-X} \end{vmatrix} = 0$$

hesaplanır. Böylece e^{-X} ve $5e^{-X}$ lineer bağımlıdır. Dolayısıyla $y = c_1 e^{-X} + c_2 5e^{-X}$ fonksiyonu denklemden yerine konulmaz.

NOT : $W \neq 0$ ise genel çözüm olur.

$W = 0$ ise denlemi sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir.

4.3. SABİT KATSAYILI HOMOJEN LINEER DİF. DENKLEMLER

6

Karakteristik Denklem: a, b ve c reel sabitler olma üzere

$$ay'' + by' + cy = 0 \quad \dots \quad (4.10)$$

dif. denklemine

$$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$$

şeklinde bir karakteristik denkleme karşılık gelir.

ÖRNEK: $y'' + 3y' - 4y = 0$ dif. denkleminin karakteristik denkle-

mini $\lambda^2 + 3\lambda - 4 = 0$ dır.

Genel Çözümü: $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$ karakteristik denkleminin

kökları

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

dir. Burada $\Delta = b^2 - 4ac$ diskriminantın aldığı 3 farklı değere göre kökler reel veya kompleks olabilir. Buna göre

I. Durum: $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ ise λ_1 ve λ_2 reel ve farklıdır. Bu durumda dif. denklemin genel çözümü

$$y = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x} \quad \dots \quad (4.12)$$

olur. $\lambda_2 = -\lambda_1$ özel durumunda (4.12) çözümü

$$y = k_1 \cosh \lambda_1 x + k_2 \sinh \lambda_2 x$$

olarak yeniden yazılabilir.

II. Durum: $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ ise yarı $\lambda_1 = \lambda_2$ ve iki lineer bağımsız. çözüm $e^{\lambda_1 x}$ ve $x e^{\lambda_2 x}$ tir. Genel çözümü

$$y = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 x e^{\lambda_1 x} \quad \dots \quad (4.13)$$

olur.

(7)

III. Durum: $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ ise λ_1 ve λ_2 komplekslerdir.

Burada $\lambda_1 = \alpha + i\beta$ ve $\lambda_2 = \alpha - i\beta$ olup iki eşlenik kompleks sayı elde edilir.

Burada iki lineer bağımsız çözümü $e^{(\alpha+i\beta)x}$ ve $e^{(\alpha-i\beta)x}$ dir ve böylece dif. denklemin genel çözümü

$$y = k_1 e^{(\alpha+i\beta)x} + k_2 e^{(\alpha-i\beta)x}$$

şeklinde dir. Ancak dif. denklemin genel çözümü bu şekilde verilmesi genel olarak pek uygun olmadığından Euler formülü adı verilen

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

bağıntısı kullanılarak genel çözümü

$$y = C_1 e^{\alpha x} \cos\beta x + C_2 e^{\alpha x} \sin\beta x \quad (4.14)$$

şeklinde verilebilir.

UYARI: Yukarıdaki çözümler, dif. denklemin lineer olmadığı veyla sabit katsayılı olmadığında geçerli değildir. Örnek $y'' - x^2 y = 0$ denklemini düşünelim. Karakteristik denklemin kökleri $\lambda_1 = x$ ve $\lambda_2 = -x$ dir. Ancak çözüm

$$y = C_1 e^{(x) \cdot x} + C_2 e^{(-x) \cdot x} = C_1 e^{x^2} + C_2 e^{-x^2}$$

değildir. (Değişken katsayıllılar ilerde verilecektir)

ÖRNEK: $y'' - y' - 2y = 0$ denklemini gözünüz.

Çözüm: Karakteristik denklemin $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$ şeklinde olup

$$(\lambda+1)(\lambda-2) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -1 \text{ ve } \lambda_2 = 2 \text{ bulunur. Kökler}$$

reel ve farklı olduğundan I. Duruma göre çözümü

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x}$$

olur.

8

ÖRNEK: $y'' - 5y = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm: Karakteristik denklemin $\lambda^2 - 5 = 0$ dir. $\lambda_1 = +\sqrt{5}$

ve $\lambda_2 = -\sqrt{5}$ olup çözüm

$$y = c_1 e^{\sqrt{5}x} + c_2 e^{-\sqrt{5}x}$$

dir.

ÖRNEK: $y'' - 8y' + 16y = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm: $\lambda^2 - 8\lambda + 16 = 0 \Rightarrow \Delta = 64 - 4 \cdot 16 = 0$ olup
çakışık iki kök vardır.

$$\lambda^2 - 8\lambda + 16 = 0 \Rightarrow (\lambda - 4)^2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 4, \lambda_2 = 4$$

Kökler reel ve eşit. old. II. Duruma göre çözüm

$$y = c_1 e^{4x} + c_2 x e^{4x}$$

olur.

ÖRNEK: $y'' - 6y' + 25y = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm: $\lambda^2 - 6\lambda + 25 = 0$

$$\Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{-(-6) \pm \sqrt{(-6)^2 - 4 \cdot 25}}{2} = 3 \pm \frac{\sqrt{-64}}{2}$$

$$= 3 \pm \frac{\sqrt{64i^2}}{2} = 3 \pm 4i \text{ old. III. Duruma göre}$$

$$y = c_1 e^{3x} \cdot \cos 4x + c_2 e^{3x} \cdot \sin 4x$$

olur.

ÖRNEK: $y''' + 2y'' - y' - 2y = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm: $\lambda^3 + 2\lambda^2 - \lambda - 2 = 0 \Rightarrow (\lambda^2 - 1)(\lambda + 2) = 0$

$$\Rightarrow \lambda_1 = -1, \lambda_2 = +1 \text{ ve } \lambda_3 = -2 \text{ old. genel çözüm}$$

$$y = c_1 e^{-x} + c_2 e^x + c_3 e^{-2x}$$

dir.

⑨

ÖRNEK : $y^{(IV)} - 9y'' + 20y = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm : $\lambda^4 - 9\lambda^2 + 20 = 0 \Rightarrow m^2 - 9m + 20 = 0 \quad (\lambda^2 = m)$

$\Rightarrow m = 4$ ve $m = 5 \Rightarrow \lambda_1 = -2, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -\sqrt{5}, \lambda_4 = \sqrt{5}$.

$\Rightarrow y = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{2x} + c_3 e^{\sqrt{5}x} + c_4 e^{-\sqrt{5}x}$

ÖRNEK : $y^{(V)} - 2y^{(IV)} + y''' = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm : $\lambda^5 - 2\lambda^4 + \lambda^3 = 0 \Rightarrow \lambda^3(\lambda^2 - 2\lambda + 1) = 0$

$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0, \lambda_4 = \lambda_5 = 1$

$\Rightarrow y = c_1 e^{0x} + c_2 x e^{0x} + c_3 x^2 e^{0x} + c_4 e^{1x} + c_5 x e^{1x}$

ÖRNEK : $y^{(III)} - 6y'' + 2y' + 36y = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm : $\lambda^3 - 6\lambda^2 + 2\lambda + 36 = 0$ karakteristik denk-
leminde $\lambda = -2$ yazılırsa denklemini sağlar. Bu nedenle
($\lambda + 2$) terimi bu karakteristik denklemin bir çarpanı olur

$$\begin{array}{r} \lambda^3 - 6\lambda^2 + 2\lambda + 36 \mid \lambda + 2 \\ - \lambda^3 + 2\lambda^2 \\ \hline -8\lambda^2 + 2\lambda \\ - -8\lambda^2 + 16\lambda \\ \hline +18\lambda + 36 \\ - 18\lambda + 36 \\ \hline 0 \end{array}$$

$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 2\lambda + 36 = (\lambda + 2)(\lambda^2 - 8\lambda + 18)$
 $\Rightarrow \lambda^2 - 8\lambda + 18 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{-(-8) \pm \sqrt{64 - 72}}{2} = 4 \pm i\sqrt{2}$

olup genel çözüm

$y = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{4x} \cos \sqrt{2} x + c_3 e^{4x} \sin \sqrt{2} x$

(10)

ÖRNEK: $9y'' + 6y' + 5y = 0$, $y(0) = 6$, $y'(0) = 0$
denkleminin çözümünü.

Gözlem: $9\lambda^2 + 6\lambda + 5 = 0$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 4 \cdot 9 \cdot 5}}{18} = \frac{-6 \pm \sqrt{-144}}{18}$$

$$= \frac{-6 \pm \sqrt{144 \cdot i^2}}{18} = -\frac{1}{3} \pm \frac{2}{3}i$$

olduğundan genel çözümü

$$y = c_1 e^{-\frac{1}{3}x} \cdot \cos \frac{2}{3}x + c_2 e^{-\frac{1}{3}x} \sin \frac{2}{3}x$$

bulunur.

$y(0) = 6$ olduğundan $x=0$ ve $y=6$ değerleri için

$$6 = \underbrace{c_1 e^0}_{=1} \cos 0 + \underbrace{c_2 e^0}_{=0} \sin 0 \Rightarrow \boxed{c_1 = 6}$$

$y'(0) = 0$ olduğundan $x=0$ ve $y=0$ değerleri için

önce y' türevini hesaplayalım:

$$y' = -\frac{1}{3} c_1 e^{-\frac{1}{3}x} \cdot \cos \frac{2}{3}x + c_1 e^{-\frac{1}{3}x} \left(-\frac{2}{3} \sin \frac{2}{3}x \right) \\ - \frac{1}{3} c_2 e^{-\frac{1}{3}x} \sin \frac{2}{3}x + c_2 e^{-\frac{1}{3}x} \cdot \left(\frac{2}{3} \cos \frac{2}{3}x \right) = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{3} c_1 + c_2 \cdot \frac{2}{3} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{3} \cdot 6 + c_2 \cdot \frac{2}{3} = 0 \Rightarrow \boxed{c_2 = 3}$$

olup çözümü

$$y = 6e^{-\frac{1}{3}x} \cos \frac{2}{3}x + 3e^{-\frac{1}{3}x} \sin \frac{2}{3}x$$

olur.

4.4. SABİT KATSAYILI, HOMOJEN OLMAYAN LINEER DİF. DENKLEMLER

n -yinci mertebeden sabit katsayılı ve homojen olmayan bir lineer dif. denklemler

$$b_n(x) \cdot y^{(n)} + b_{n-1}(x) y^{(n-1)} + \dots + b_1(x) y' + b_0(x) y = g(x) \dots (4.15)$$

şeklindeydi. Böyle bir denklemin genel çözümünü $y = y_h + y_p$ şeklinde veriliyordu. Eğer $g(x) = 0$ ise denklemin homojen çözümünü y_h idi ve bundan önceki kısımdaki homojen bir dif. denklemin nasıl çözüleceğini gördük. Şimdi ise amaçımız $g(x) \neq 0$ iken yani homojen olmayan bu denklemin bir özel çözümünü olan ve keyfi sabit sayı içermeyen y_p çözümünü ve sonuç olarak da (4.15) denkleminin genel çözümünü bulmaktır.

y_p nin bulunması ile ilgili olarak birkaç metod geliştirilmiştir. Bu metotlardan "Belirli Katsayılar Metodu" ve "Parametrelerin Değiştirilmesi Metodu" nu inceleyeceğiz.

A) BELİRSİZ KATSAYILAR METODU

Metodun Basit Hali

Belirli katsayılar metodu, yalnızca eğer $g(x)$ ve tüm türevleri $\{y_1(x), \dots, y_n(x)\}$ ile gösterilen aynı sonlu lineer bağımsız fonksiyonlar kümesi cinsinden yazılabilirse uygulanabilir. Metoda $A, B, C, \dots$ keyfi sabitler olmak üzere

$$y_p = A y_1(x) + B y_2(x) + C y_3(x) + \dots + K y_n(x)$$

biçiminde bir özel çözümü kabul edilerek bulunur. Daha sonra bu çözümü dif. denkleminde yerine yazılıp benzer terimlerin katsayıları eşitlenerek $A, B, C, \dots$ sabitleri bulunur.

(12)

I. Durum : $g(x) = P_n(x)$ ise

(Yanî eşitliğin sağ tarafı, n -yinci dereceden bir polinom ise)

$$y_p = AX^n + BX^{n-1} + CX^{n-2} + \dots + KX + M$$

biçiminde bir çözümü kabul edilir.

II. Durum : $g(x) = ke^{ax}$ ise (a ve k sabit)

$$y_p = Ae^{ax}$$

biçiminde bir çözümü kabul edilir.

III. Durum : $g(x) = k_1 \sin \beta x + k_2 \cos \beta x$ ise (k_1, k_2, β sabit)

$$y_p = A \sin \beta x + B \cos \beta x$$

biçiminde bir özel çözümü kabul edilir.

Uyarı : k_1 ve k_2 'den birisi sıfır bile olsa III. durumda y_p geçerlidir. Mada $g(x) = k_1 \sin \beta x$ olsa bile

$$y_p = A \sin \beta x + B \cos \beta x$$

dır.

Genelleştirmeler :

Eğer $g(x)$ terimi, yukarıda verilen 3 farklı fonksiyon türünün herhangi ikisinin veya hepsinin birbiriyle çarpımı ise, y_p bunlara karılık kabul edilen çözümlerin çarpımı olarak alınır ve bunlar "birleştirilir." Örneğin

$$g(x) = e^{ax} \cdot P_n(x) \text{ ise } (\text{Üstel ile polinomun çarpımı ise})$$

$$y_p = e^{ax} (AX^n + BX^{n-1} + \dots + KX + M)$$

Kabul edilir. Eğer

$$g(x) = P_n(x) \cdot \sin \beta x \text{ ise}$$

$$y_p = (AX^n + \dots + KX + M) \sin \beta x + (AX^n + \dots + KX + M) \cos \beta x$$

Kabul edilir.

Değişiklikler

(13)

Eğer kayıf sabitler göz ardı edildiğinde, kabul edilen y_p çözümün herhangi bir terimi y_h nin de bir terimi ise, o zaman kabul edilen y_p çözümü x^n ile çarpılarak değerlendirilmelidir. Burada m sayısı, terimlerdeki farklılığı sağlayacak en küçük pozitif tam sayıdır.

ÖRNEK : $y'' - y' - 2y = 4x^2$ denklemini çözünüz.

Çözüm : öncelikle denklemin homojen çözümünü bulalım.

$$\lambda^2 - \lambda - 2 = 0 \Rightarrow (\lambda - 2)(\lambda + 1) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -1 \text{ ve } \lambda_2 = 2.$$

$$\Rightarrow y_h = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x} \text{ homojen çözümü bulunur.}$$

Şimdi de y_p özel çözümünü bulalım:

$$g(x) = 4x^2 \text{ bir polinom old. I. Duruma göre}$$

$$y_p = Ax^2 + Bx + C \text{ kabul edelim. Böylece}$$

$$y_p' = 2Ax + B \text{ ve}$$

$$y_p'' = 2A$$

olur. y_p , y_p' ve y_p'' ifadeleri verilen dif. denkleme yerine yazılırsa

$$y_p'' - y_p' - 2y_p = 4x^2$$

$$\Rightarrow 2A - (2Ax + B) - 2(Ax^2 + Bx + C) = 4x^2$$

$$\Rightarrow \underbrace{(-2A)}_{=4} x^2 + \underbrace{(-2A-2B)}_{=0} x + \underbrace{(2A-B-2C)}_{=0} = 4x^2 + 0x + 0$$

$$\text{Buradan } A = -2, B = 2, C = -3 \text{ bulunur. Böylece}$$

$$y_p = -2x^2 + 2x - 3 \text{ özel çözümü bulunur. Dolayısıyla}$$

genel çözüm

$$y = y_h + y_p = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x} - 2x^2 + 2x - 3$$

olur.

(14)

ÖRNEK : $y'' - y' - 2y = 8e^{3x}$ denklemini çözünüz.

Çözüm : Önceli sorudan $y_h = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x}$ bulunmuştur.

$g(x) = 8e^{3x}$ old. II. Duruma göre

$$y_p = Ae^{3x}$$

kabul edelim. Buradan

$$y_p' = 3Ae^{3x} \quad \text{ve}$$

$$y_p'' = 9Ae^{3x}$$

bulunur. Bu ifadeler verilen dif. denkleme yerine yazılırsa,

$$9Ae^{3x} - 3Ae^{3x} - 2Ae^{3x} = 8e^{3x}$$

$$\Rightarrow 4Ae^{3x} = 8e^{3x} \Rightarrow 4A = 8 \Rightarrow A = 2$$

$$\Rightarrow y_p = Ae^{3x} = 2e^{3x} \quad \text{özel çözümü ve taşıyıcı}$$

$$y = y_h + y_p = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x} + 2e^{3x}$$

genel çözümü bulunur.

ÖRNEK : $y'' - y' - 2y = 3\sin 2x$ denklemini çözünüz.

Çözüm : $y_h = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x}$ bulunmuştur.

$g(x) = 3\sin 2x$ old. III. duruma göre

$$y_p = A\sin 2x + B\cos 2x \quad \text{kabul edelim. Buradan}$$

$$y_p' = 2A\cos 2x - 2B\sin 2x$$

$$y_p'' = -4A\sin 2x - 4B\cos 2x$$

ifadeleri verilen denkleme yerine yazılırsa

$$(-4A\sin 2x - 4B\cos 2x) - (2A\cos 2x - 2B\sin 2x) - 2(A\sin 2x + B\cos 2x) = 3\sin 2x$$

$$\Rightarrow (-6A + 2B)\sin 2x + (-6B - 2A)\cos 2x = 3\sin 2x + 0\cos 2x$$

$$\Rightarrow A = \frac{19}{20}, \quad B = -\frac{19}{60} \Rightarrow y_p = \frac{19}{20}\sin 2x - \frac{19}{60}\cos 2x \quad \text{özel}$$

genel çözüm

$$y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x} + \frac{19}{20}\sin 2x - \frac{19}{60}\cos 2x \quad 80$$

dir.

(15)

ÖRNEK : $y' - 5y = 2e^{5x}$ denklemini gözünüz.

Gözüm : $\lambda - 5 = 0 \Rightarrow \lambda = 5$ olup $y_h = c_1 e^{5x}$ homojen çözümü bulunur.

$g(x) = 2e^{5x}$ olduğundan y_p 'nin tahmini II. Duruma göre $y_p = Ae^{5x}$ olur. Fakat y_p ile y_h aynı biçimde olduğundan y_p yi değiştirmeniz gerekir. y_p 'yi x ile çarparsak ($m=1$)

$$y_p = Ax e^{5x}$$

elde edilir. Bu ifadenin y_h ile hiçbir ortak terimi olmadığından özel gözüm olarak kabul edilebilir. Türev alınırsa

$$y_p' = Ae^{5x} + 5Ax e^{5x}$$

olup verilen dif. denkleme yerine yazılırsa

$$(Ae^{5x} + 5Ax e^{5x}) - 5(Ax e^{5x}) = 2e^{5x}$$

$$\Rightarrow Ae^{5x} = 2e^{5x}$$

$$\Rightarrow A = 2$$

bulunur. Böylece

$$y_p = 2x e^{5x}$$

özel çözümü elde edilir. Dolayısıyla genel çözümü

$$y = y_h + y_p = c_1 e^{5x} + 2x e^{5x}$$

bulunur.

(16)

ÖRNEK : $y'' + 4y = 5 \cos 2x$ denkleminin çözünürlüğü.

Çözüm : $\lambda^2 + 4 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm 2i = 0 \pm 2i$

$$\Rightarrow y_h = c_1 e^{0x} \cos 2x + c_2 e^{0x} \sin 2x$$

$$\Rightarrow y_h = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x$$

homojen çözümü elde edilir.

Şimdi de y_p özel çözümünü bulalım. Öncelikle

$$y_p = A \sin 2x + B \cos 2x$$

kabul edelim. Bu kabulü $\cos 2x$ ile y_h çözümlerinde $\cos 2x$ aynı biçimde old. y_p yi değiştirmediğiz. Bu nedenle y_p yi x ile karşılaştırsak

$$y_p = A x \sin 2x + B x \cos 2x$$

olur. Pürev alınırsa

$$y_p' = A \sin 2x + A x \cdot 2 \cos 2x + B \cos 2x + B x (-2 \sin 2x)$$

$$\Rightarrow y_p'' = 2A \cos 2x + A \cdot 2 \cos 2x + A x (-4 \sin 2x) + (-2B \sin 2x) + B (-2 \sin 2x) + B x (-4 \cos 2x)$$

olup bunlar verilen dif. denkleminde yerine yerlerse,

$$[4A \cos 2x - 4A x \sin 2x - 4B \sin 2x - 4B x \cos 2x]$$

$$+ 4[A x \sin 2x + B x \cos 2x] = 5 \cos 2x$$

$$\Rightarrow \underbrace{4A \cos 2x}_{=5} - \underbrace{4B \sin 2x}_{=0} = 5 \cos 2x + 0 \cdot \sin 2x$$

$$\Rightarrow A = \frac{5}{4} \quad \text{ve} \quad B = 0$$

$$\Rightarrow y_p = A x \sin 2x + B x \cos 2x = \frac{5}{4} x \sin 2x + 0$$

$$\Rightarrow y = y_h + y_p = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x + \frac{5}{4} x \sin 2x$$

genel çözümü bulunur.

17

Örnek: $y''' - y' = 3e^{2x} + 4e^{-x}$ denklemini çözünüz.

Çözüm: $\lambda^3 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda(\lambda^2 - 1) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = +1$

$\Rightarrow y_h = c_1 e^{0x} + c_2 e^{-x} + c_3 e^{+x}$ homojen çözümü bulunur.

Şimdi y_p özel çözümünü bulalım:

Eğer $y_p = Ae^{2x} + Be^{-x}$ kabul edilirse y_p 'deki

Be^{-x} ile y_h 'deki $c_3 e^{-x}$ aynı bittenden olur. O za-

man Be^{-x} terimi x ile çarpılmalıdır. Yani

$y_p = Ae^{2x} + Bxe^{-x}$ kabul edilirse

$y_p' = 2Ae^{2x} + Be^{-x} - Bxe^{-x}$

$y_p'' = 4Ae^{2x} - Be^{-x} - (Be^{-x} + Bx(-e^{-x}))$

$= 4Ae^{2x} - 2Be^{-x} + Bxe^{-x}$

$y_p''' = 8Ae^{2x} + 2Be^{-x} + (Be^{-x} + Bx(-e^{-x}))$

$= 8Ae^{2x} + 3Be^{-x} - Bxe^{-x}$

bulunur. Bu terimler verilen denkleme yerlerine yazılırsa

$(8Ae^{2x} + 3Be^{-x} - Bxe^{-x}) - (2Ae^{2x} + Be^{-x} - Bxe^{-x}) = 3e^{2x} + 4e^{-x}$

$\Rightarrow 6Ae^{2x} + 2Be^{-x} = 3e^{2x} + 4e^{-x}$

$\Rightarrow 6A = 3$ ve $2B = 4 \Rightarrow A = \frac{1}{2}$ ve $B = 2$ olup

$y_p = \frac{1}{2}e^{2x} + 2xe^{-x}$ özel çözümü ve böylece

$y = y_h + y_p = c_1 + c_2 e^{-x} + c_3 e^{+x} + \frac{1}{2}e^{2x} + 2xe^{-x}$

genel çözümü elde edilir.

ÖRNEK: $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 2xe^{-x}$ denklemini gözünüz.

(18)

Çözüm: $\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 = 0$

$\Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$ ve $\lambda_3 = 3$ olduğundan
 $y_h = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + c_3 e^{3x}$ homojen çözümü bulunur.

Şimdi y_p özel çözümünü araştıracağız:

$g(x) = 2xe^{-x}$ ifadesi bir polinom ile üstel çarpımı old.

$$y_p = (Ax+B) \cdot e^{-x}$$

Kabul edelim. Böylece

$$y_p' = -Ax e^{-x} + A e^{-x} - B e^{-x}$$

$$y_p'' = Ax e^{-x} - 2A e^{-x} + B e^{-x}$$

$$y_p''' = -Ax e^{-x} + 3A e^{-x} - B e^{-x}$$

Çözümleri, verilen dif. denkleme yerlerine yazarsak

$$(-Ax e^{-x} + 3A e^{-x} - B e^{-x}) - 6(Ax e^{-x} - 2A e^{-x} + B e^{-x}) + 11(-Ax e^{-x} + A e^{-x} - B e^{-x}) - 6(Ax e^{-x} + B e^{-x}) = 2xe^{-x}$$

$$\Rightarrow \frac{-24Ax e^{-x}}{=2} + \frac{(26A - 24B)}{=0} e^{-x} = 2x e^{-x} + 0 \cdot e^{-x}$$

$$\Rightarrow A = -\frac{1}{12}, \quad B = \frac{-13}{144}$$

$$\Rightarrow y_p = -\frac{1}{12} x e^{-x} - \frac{13}{144} e^{-x}$$

özel çözümü ve böylece

$$y = y_h + y_p = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + c_3 e^{3x} - \frac{1}{12} x e^{-x} - \frac{13}{144} e^{-x}$$

genel çözümü bulunur.

(19)

ÖRNEK: $y' - 5y = 3e^x - 2x + 1$ denklemini çözünüz.

Çözümü: $\lambda - 5 = 0 \Rightarrow \lambda = 5 \Rightarrow$

$\Rightarrow y_h = C_1 e^{5x}$ homojen çözümü elde edilir.

$g(x) = 3e^x - 2x + 1$ ifadesi üstel fonk. ile polinom toplamı olduğundan

$y_p = Ae^x + (Bx + C)$ kabul edilirse

$y_p' = Ae^x + B$

olup verilen denkleme yerine yazılırsa

$$Ae^x + B - 5(Ae^x + Bx + C) = 3e^x - 2x + 1$$

$$\Rightarrow -4Ae^x - 5Bx + (B - 5C) = 3e^x - 2x + 1$$

$$\Rightarrow -4A = 3, \quad -5B = -2, \quad B - 5C = 1$$

$$\Rightarrow A = -3/4 \quad B = 2/5 \quad C = -3/25$$

$$\Rightarrow y_p = -\frac{3}{4}e^x + \frac{2}{5}x - \frac{3}{25}$$

özel çözümü ve böylece

$$y = y_h + y_p = C_1 e^{5x} - \frac{3}{4}e^x + \frac{2}{5}x - \frac{3}{25}$$

genel çözümü elde edilir.

B) PARAMETRELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ METODU

Parametrelerin değiştirilmesi, ilgili $L(y) = 0$ homojen denkleminin çözümü bilindiğinde n -yüncü mertebeden $L(y) = g(x)$ lineer dif. denkleminin bir özel çözümünü bulmanın bir başka metodudur.

$y_1(x), \dots, y_n(x)$ 'ler $L(y) = 0$ denkleminin lineer bağımsız çözümü ise o zaman $L(y) = 0$ denkleminin homojen çözümünün

$$y_h = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_n y_n(x)$$

olduğunu biliyoruz.

Metot :

$L(y) = g(x)$ 'in bir özel çözümü

$$y_p = v_1 y_1 + v_2 y_2 + \dots + v_n y_n \dots \dots \dots (4.16)$$

bilgiindedir. Burada $v_1, v_2, \dots, v_n$ 'ler bulunması gereken fonksiyonlardır.

$v_1, v_2, \dots, v_n$ 'leri bulmak için aşağıdaki lineer denklemler $v_1', v_2', \dots, v_n'$ türevleri için ortak çözülür.

$$v_1' y_1 + v_2' y_2 + \dots + v_n' y_n = 0$$

$$v_1' y_1' + v_2' y_2' + \dots + v_n' y_n' = 0$$

$$\vdots$$
$$v_1' y_1^{(n-2)} + v_2' y_2^{(n-2)} + \dots + v_n' y_n^{(n-2)} = 0$$

$$v_1' y_1^{(n-1)} + v_2' y_2^{(n-1)} + \dots + v_n' y_n^{(n-1)} = g(x)$$

Donra her bir integral sabitî gözardı edilerek integral alınıp $v_1, v_2, \dots, v_n$ 'ler bulunur ve (4.16) 'da yerlerine yazılır.

(21)

Örneğin, $n=3$ özel durumu için

$$v_1' y_1 + v_2' y_2 + v_3' y_3 = 0$$

$$v_1' y_1' + v_2' y_2' + v_3' y_3' = 0$$

$$v_1' y_1'' + v_2' y_2'' + v_3' y_3'' = g(x)$$

denklemleri çözülür.

$n=2$ özel durumu için

$$v_1' y_1 + v_2' y_2 = 0$$

$$v_1' y_1' + v_2' y_2' = g(x)$$

denklemleri ve $n=1$ özel durumu için

$$v_1' y_1 = g(x)$$

tek denklemleri elde edilir.

Metodun Kapsamı

Parametrelerin değiştirilmesi metodu her lineer diferansiyel denkleme uygulanabilir. Buradan dolayı Belirsiz Katsayılar metodundan daha güçlüdür. Ancak her iki metodun da uygulanabilir olduğu durumlarda Belirsiz Katsayılar Metodu tercih edilir.

Örnek: $y'' + y = \tan x$ denklemini çözüyoruz.

Çözümü: Homojen kısmın genel çözümü

$$y_h = c_1 \cos x + c_2 \sin x \text{ dir.}$$

Parametrelerin değiştirilmesi metoduna göre

$$y_p = v_1 \underbrace{\cos x}_{y_1} + v_2 \underbrace{\sin x}_{y_2} \dots \dots \dots (*)$$

olur. Böylece

(22)

$$\left. \begin{aligned} v_1' \cdot (\cos x) + v_2' (\sin x) &= 0 \\ v_1' (-\sin x) + v_2' (\cos x) &= \tan x \end{aligned} \right\}$$

denklem sistemi elde edilir. Burada v_1' ve v_2' bilinmeyenlerini bulmalıyız. Cramer metoduydu.

$$\Delta = \begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix} = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 0 & \sin x \\ \tan x & \cos x \end{vmatrix} = -\tan x \sin x = -\frac{\sin^2 x}{\cos x} = \cos x - \sec x$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} \cos x & 0 \\ -\sin x & \tan x \end{vmatrix} = \sin x$$

$$\Rightarrow v_1' = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \cos x - \sec x \quad \text{ve}$$

$$v_2' = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \sin x$$

bulunur. v_1 ve v_2 yi bulmak için integral alınırsa

$$v_1 = \int v_1' dx = \int (\cos x - \sec x) dx = \sin x - \ln |\sec x + \tan x|$$

$$v_2 = \int v_2' dx = \int \sin x dx = -\cos x$$

fonksiyonları elde edilir. v_1 ve v_2 nin bu değerleri

⊛ denkleminde yerlerine yazılırsa

$$y_p = v_1 \cos x + v_2 \sin x$$

$$\Rightarrow y_p = (\sin x - \ln |\sec x + \tan x|) \cos x + (-\cos x) \cdot \sin x$$

$$\Rightarrow y_p = -\cos x \cdot \ln |\sec x + \tan x| \quad \text{özel çözümleri ve}$$

$$\Rightarrow y = y_h + y_p = c_1 \cos x + c_2 \sin x - \cos x \ln |\sec x + \tan x|$$

genel çözümü bulunur.

(23)

ÖRNEK: $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$ denklemini çözünüz.

Çözüm: Denklemin homojen çözümünü

$$y_h = c_1 e^x + c_2 x e^x$$

bulunur. Böylece özel çözümü için

$$y_p = v_1 e^x + v_2 x e^x$$

(x)

kabul edilir. Buna göre

$$v_1'(e^x) + v_2'(xe^x) = 0$$

$$v_1'(e^x) + v_2'(e^x + xe^x) = \frac{e^x}{x}$$

denklemin sistemini elde ederiz. Burada v_1' ve v_2' bilinmeyenlerini bulmak için Cramer metodu uygulanırsa

$$\Delta = \begin{vmatrix} e^x & xe^x \\ e^x & e^x + xe^x \end{vmatrix} = e^{2x}$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 0 & xe^x \\ e^x & e^x + xe^x \end{vmatrix} = -e^{2x}$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} e^x & 0 \\ e^x & \frac{e^x}{x} \end{vmatrix} = \frac{e^{2x}}{x}$$

$$\Rightarrow v_1' = \frac{\Delta_1}{\Delta} = -1 \quad \text{ve} \quad v_2' = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow v_1 = \int v_1' dx = \int -1 \cdot dx = -x \quad \text{ve}$$

$$v_2 = \int v_2' dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln|x|$$

değerleri (x) da yerlerine yazılırsa özel çözüm

$$y_p = -x e^x + x e^x \ln|x| \quad \text{ve genel çözüm}$$

$$y = y_h + y_p = c_1 e^x + c_2 x e^x - x e^x + x e^x \ln|x|$$

bulunur.

(24)

ÖRNEK: $y''' + y' = \sec x$ denklemini çözünüz.

Çözüm: $\lambda^3 + \lambda = 0 \Rightarrow \lambda(\lambda^2 + 1) = 0, \lambda_1 = 0, \lambda_{2,3} = \pm i$

$\Rightarrow y_h = c_1 + c_2 \cos x + c_3 \sin x$ homojen çözümü bulunur.

Özel çözüm ise

$$y_p = v_1 + v_2 \cos x + v_3 \sin x \quad \dots \quad (*)$$

formundadır. Buna göre

$$\left. \begin{aligned} v_1' \cdot (1) + v_2' (\cos x) + v_3' (\sin x) &= 0 \\ v_1' \cdot (0) + v_2' (-\sin x) + v_3' (\cos x) &= 0 \\ v_1' (0) + v_2' (-\cos x) + v_3' (-\sin x) &= \sec x \end{aligned} \right\}$$

denklemleri yazılabilir. Cramer metoduyla

$$v_1' = \sec x, \quad v_2' = -1 \quad \text{ve} \quad v_3' = -\tan x$$

elde edilir. Integral alınırsa

$$v_1 = \int v_1' dx = \int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x|$$

$$v_2 = \int v_2' dx = \int (-1) dx = -x$$

$$v_3 = \int v_3' dx = \int (-\tan x) dx = -\int \frac{\sin x}{\cos x} dx = -\ln |\cos x|$$

bilinmeyen fonksiyonları bulunur. Bu fonksiyonlar $(*)$

eriğinde yerlerine yazılırsa

$$y_p = \ln |\sec x + \tan x| - x \cos x + \sin x - \ln |\cos x|$$

özel çözümü ve böylece

$$y = y_h + y_p = c_1 + c_2 \cos x + c_3 \sin x + \ln |\sec x + \tan x|$$

$$- x \cos x + \sin x - \ln |\cos x|$$

genel çözümü bulunur.

4.5. CAUCHY - EULER DENKLEMLERİ

Her bir terim $x^{(k)} y$ ifadesinin bir sabitle çarpımı şeklinde olan

$$\alpha_n x^n y^{(n)} + \alpha_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + \alpha_1 x y' + \alpha_0 y = b(x) \dots (4.17)$$

tipindeki n . mertebeden değişken katsayılı diferansiyel denklemlere Cauchy-Euler denlemi denir. Buradan $\alpha_n \neq 0$ olmak üzere, $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ 'ler sabitlerdir. Bu tip denklemler bir dönüşüm yardımıyla sabit katsayılı hale indirgenerek çözümler.

Metot : (4.17) ile verilen Cauchy-Euler denlemi $x > 0$, $x = e^t$ dönüşümü ile sabit katsayılı bir lineer denleme dönüştür. Bu durumda $x = e^t \Rightarrow t = \ln x$ olmak üzere

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{x} \Rightarrow \boxed{x \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} \right) = \frac{d^2 y}{dt^2} \cdot \frac{dt}{dx} \cdot \frac{dt}{dx} + \frac{d^2 y}{dx^2} \cdot \frac{dt}{dx} \cdot \frac{1}{x}$$

$$= \frac{d^2 y}{dt^2} \left(\frac{dt}{dx} \right)^2 + \frac{dy}{dt} \cdot \frac{d^2 t}{dx^2} = \left(\frac{1}{x} \right)^2 \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt}$$

$$= \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) \Rightarrow \boxed{x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}}$$

bulunur.

Benzer şekilde

$$\boxed{x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} = \frac{d^3 y}{dt^3} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt}}$$

elde edilir. Bu şekilde daha yüksek mert. türevler elde edilebilir. Bu türevler (4.17) denkleminde yerine yazılarak sabit katsayılı hale dönüştürülür.

Not: Yukarıdaki çözüm $x > 0$ için verilmiştir, $x < 0$ için çözümleri bulabilmek için $-x = e^t$ dönüşümü yapılır. ⁹¹

ÖRNEK: $x^2 y'' - 2xy' + 2y = x^3$ Cauchy-Euler denklemini çözünüz. (26)

Çözüm: $x = e^t$, $x > 0 \Rightarrow t = \ln x$ dönüşümü yapılırsa $xy' = \frac{dy}{dt}$ ve $x^2 y'' = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}$ olacağından verilen

denkleme yerine yazılırsa

$$\left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) - 2 \frac{dy}{dt} + 2y = e^{3t}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 y}{dt^2} - 3 \frac{dy}{dt} + 2y = e^{3t} \Rightarrow y'' - 3y' + 2y = e^{3t}$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = +1 \text{ ve } \lambda_2 = +2$$

$\Rightarrow y_h = c_1 e^t + c_2 e^{2t}$ homogen çözümü bulunur.

$y_p = A e^{3t}$ kabul edilirse $y_p' = 3A e^{3t}$ ve $y_p'' = 9A e^{3t}$ old.

$$9A e^{3t} - 3 \cdot 3A e^{3t} + 2A e^{3t} = e^{3t}$$

$$\Rightarrow 2A e^{3t} = e^{3t} \Rightarrow A = 1/2$$

$\Rightarrow y_p = \frac{1}{2} e^{3t}$ olup genel çözümü

$$y = y_h + y_p = c_1 e^t + c_2 e^{2t} + \frac{1}{2} e^{3t}$$

ve $e^t = x$ olduğundan

$$y = c_1 x + c_2 x^2 + \frac{1}{2} x^3 \text{ bulunur.}$$

ÖRNEK: $x^3 y''' - 4x^2 y'' + 8xy' - 8y = 4 \ln x$ denklemini çözünüz.

Çözüm: $x = e^t \Rightarrow t = \ln x$ dönüşümü yapılırsa ve $xy' = \frac{dy}{dt}$, $x^2 y'' = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}$, $x^3 y''' = \frac{d^3 y}{dt^3} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt}$

türevleri verilen denkleme yerine yazılırsa

$$\left(\frac{d^3 y}{dt^3} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} \right) - 4 \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) + 8 \frac{dy}{dt} - 8y = 4t$$

$$\Rightarrow \frac{d^3 y}{dt^3} - 7 \frac{d^2 y}{dt^2} + 14 \frac{dy}{dt} - 8y = 4t$$

(27)

(*)

$$\Rightarrow y''' - 7y'' + 14y' - 8y = 4t \quad \dots \dots \dots$$

$\Rightarrow \lambda^3 - 7\lambda^2 + 14\lambda - 8 = 0$ karakteristik denklemini $\lambda_1 = 1$ değeri sağladığı için polinom bölünmelidir

$$\lambda^3 - 7\lambda^2 + 14\lambda - 8 \quad \lambda - 1 \quad \lambda^2 - 6\lambda + 8$$

$$\text{olacağından} \quad \lambda^3 - 7\lambda^2 + 14\lambda - 8 = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 6\lambda + 8)$$

$$\lambda_1 = 1 \quad \lambda_2 = 2 \quad \lambda_3 = 4$$

$$\Rightarrow y_h = c_1 e^t + c_2 e^{2t} + c_3 e^{4t}$$

homojen çözümü bulunur. özel çözümü için

$$y_p = At + B$$

kabul edilirse

$$y_p' = A, \quad y_p'' = 0, \quad y_p''' = 0$$

olacağından bu türevler (*)'da yerine yazılır

$$0 - 7 \cdot 0 + 14A - 8(At + B) = 4t + 0$$

$$\Rightarrow -8At + 14A - 8B = 4t + 0$$

$$\Rightarrow A = -\frac{1}{2} \quad \text{ve} \quad B = -\frac{7}{8}$$

$$\Rightarrow y_p = -\frac{1}{2}t - \frac{7}{8} \quad \text{özel çözümü ve}$$

$$y = y_h + y_p = c_1 e^t + c_2 e^{2t} + c_3 e^{4t} - \frac{1}{2}t - \frac{7}{8}$$

$$\Rightarrow y = c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^4 - \frac{1}{2} \ln x - \frac{7}{8}$$

genel çözümü bulunur.

(28)

GÖZÜMÜ SORULAR

(Yüksek mert. Linear Dif. Denklemler)

1) $y'' - 6y' + 25y = 64e^{-x}$ denklemini çözünüz.

Çözüm: Denlemi Belirsiz Katsayılar Metoduyla çözelim:

$$\lambda^2 - 6\lambda + 25 = 0 \Rightarrow \Delta = -64 < 0 \text{ olup}$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{-64}}{2} = \frac{6 \pm \sqrt{64i^2}}{2} = 3 \pm 4i$$

$$y_h = c_1 e^{3x} \cos 4x + c_2 e^{3x} \sin 4x$$

homojen çözümü bulunur. Özel çözümü için

$$y_p = Ae^{-x}$$

kabul edilirse $y_p' = -Ae^{-x}$ ve $y_p'' = Ae^{-x}$ olacaktır

$$(Ae^{-x}) + 6Ae^{-x} + 25Ae^{-x} = 64e^{-x} \Rightarrow 32Ae^{-x} = 64e^{-x} \Rightarrow A = 2$$

$$\Rightarrow y_p = 2e^{-x} \text{ olup genel çözümü}$$

$$y = y_h + y_p = c_1 e^{3x} \cos 4x + c_2 e^{3x} \sin 4x$$

bulunur.

2) $y'' - y' - 2y = \sin 2x$ denklemini çözünüz.

Çözüm: Denlemi Belirsiz Katsayılar Metoduyla çözelim:

$$\lambda^2 - \lambda - 2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -1 \text{ ve } \lambda_2 = 2 \text{ bulunur.}$$

Buradan $y_h = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x}$ homojen çözümü elde edilir.

$$y_p = A \sin 2x + B \cos 2x \text{ kabul edilirse}$$

$$y_p' = 2A \cos 2x - 2B \sin 2x \text{ ve}$$

$$y_p'' = -4A \sin 2x - 4B \cos 2x$$

tekrarları denkleme yerine yerleştirilerek

$$(-4A \sin 2x - 4B \cos 2x) - (2A \cos 2x - 2B \sin 2x) - 2(A \sin 2x + B \cos 2x) = \sin 2x$$

$$\Rightarrow (-6A + 2B) \sin 2x + (-6B - 2A) \cos 2x = 1 \cdot \sin 2x + 0 \cdot \cos 2x$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -6A + 2B = 1 \\ -6B - 2A = 0 \end{cases} \text{ denklemlerinden } A = -3/20 \quad B = 1/20 \text{ bulunur.}$$

Böylece özel çözümü

$$y_p = -\frac{3}{20} \sin 2x + \frac{1}{20} \cos 2x$$

ve genel çözümü

$$y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x} - \frac{3}{20} \sin 2x + \frac{1}{20} \cos 2x$$

bulunur.

3. $y'' - 4y' + 3y = 9x^2 + 4$ denklemini çözünüz.

Çözüm: $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$
 $\Rightarrow y_h = c_1 e^x + c_2 e^{3x}$ homojen çözümü bulunur.

$y_p = Ax^2 + Bx + C$ kabul edilirse

$y_p' = 2Ax + B$ ve $y_p'' = 2A$ olduğundan

$$2A - 4(2Ax + B) + 3(Ax^2 + Bx + C) = 9x^2 + 4$$

$$\Rightarrow 3Ax^2 + (-8A + 3B)x + 2A - 4B + 3C = 9x^2 + 4$$

$$\Rightarrow 3A = 9, \quad -8A + 3B = 0, \quad 2A - 4B + 3C = 4$$

$$\Rightarrow A = 3, \quad B = 8, \quad C = 10$$

$$\Rightarrow y_p = 3x^2 + 8x + 10$$

$$\Rightarrow y = y_h + y_p = c_1 e^x + c_2 e^{3x} + 3x^2 + 8x + 10$$

genel çözümü bulunur.

(30)

4) $y'' - 4y = e^{2x} \sin 2x$ denklemini gözünüzde.

Çözüm: Belirsiz katsayılar metoduyla çözelim:

$$\lambda^2 - 4 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 2, \lambda_2 = -2 \text{ olup homojen çözüm}$$

$$y_h = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x} \text{ dir.}$$

$$y_p = e^{2x} (A \sin 2x + B \cos 2x) \text{ kabul edilirse}$$

$$y_p' = 2e^{2x} (A \sin 2x + B \cos 2x) + e^{2x} (2A \cos 2x - 2B \sin 2x)$$

$$y_p'' = 4e^{2x} (A \sin 2x + B \cos 2x) + 2e^{2x} (2A \cos 2x - 2B \sin 2x) + 2e^{2x} (2A \cos 2x - 2B \sin 2x) + e^{2x} (-4A \sin 2x - 4B \cos 2x)$$

$$\Rightarrow y_p' = (2Ae^{2x} - 2Be^{2x}) \sin 2x + (2Be^{2x} + 2Ae^{2x}) \cos 2x$$

$$\Rightarrow y_p'' = (-8Be^{2x}) \sin 2x + 8Ae^{2x} \cos 2x$$

$$\Rightarrow y'' - 4y = e^{2x} \sin 2x \text{ denkleminde yarılsın}$$

$$(-8Be^{2x} \sin 2x + 8Ae^{2x} \cos 2x) - 4e^{2x} (A \sin 2x + B \cos 2x) = e^{2x} \sin 2x + 0 \cdot e^{2x} \cos 2x$$

$$\Rightarrow \underbrace{(-12B - 4A)}_{=1} e^{2x} \sin 2x + \underbrace{(12A - 4B)}_{=0} e^{2x} \cos 2x = e^{2x} \sin 2x + 0$$

$$\left. \begin{array}{l} -8B - 4A = 1 \\ 8A - 4B = 0 \end{array} \right\} A = -\frac{1}{20}, B = -\frac{1}{10}$$

$$\Rightarrow y_p = e^{2x} \left(-\frac{1}{20} \sin 2x - \frac{1}{10} \cos 2x \right)$$

Enel çözümleri ve

$$y = y_h + y_p = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x} + e^{2x} \left(-\frac{1}{20} \sin 2x - \frac{1}{10} \cos 2x \right)$$

genel çözümü bulunur.

(31)

5) $y'' + y = 2x \sin 3x$ denklemini gözünüz.

Çözüm: Belirsiz katsayılar metodunu kullanalım:

$$\lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm 3i$$

$$\Rightarrow y_h = c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x \quad \text{homogen çözümü bulunur.}$$

Eğer özel çözümü olarak

$$y_p = (Ax+B)\cos 3x + (Cx+D)\sin 3x$$

kabul edilirse y_h ile ortak terimler bulunduğundan dolayı

$$y_p = x[(Ax+B)\cos 3x + (Cx+D)\sin 3x]$$

ifadeni özel çözümü olarak alınmalıdır.

Buradan türev alınarak y_p' ve daha sonra y_p'' türevi hesaplanıp $y_p'' + y_p = 2x \sin 3x$ denkleminde yerine yazılırsa ve düzenlenirse

$(12Cx + 2A + 6D)\cos 3x + (-12Ax + 2C - 6B)\sin 3x = 2x \sin 3x$ eşitliği bulunur. Buradan

$$12C = 0, \quad 2A + 6D = 0, \quad -12A = 2, \quad 2C - 6B = 0$$

bulunur ki bu eşitliklerden belirsiz katsayılar

$$A = -\frac{1}{6}, \quad B = 0, \quad C = 0, \quad D = -\frac{1}{18}$$

olarak hesaplanır. Böylece özel çözümü

$$y_p = x\left[-\frac{1}{6}x\right] \cdot \cos 3x - \frac{1}{18} \sin 3x$$

ve genel çözümü

$$y = y_h + y_p = c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x - x\left(\frac{1}{6}x \cos 3x + \frac{1}{18} \sin 3x\right)$$

bulunur.

(32)

⑥ $y'' + y = \frac{1}{\cos x}$ denklemini çözüyoruz.

Çözüm : Parametrelerin değiştirilmesi metodu kullanalım.

$$\lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda^2 = -1 \Rightarrow \lambda^2 = i^2 \Rightarrow \lambda = \pm i = 0 \pm i$$

old. homojen çözümleri

$$y_h = c_1 e^{ix} \cos x + c_2 e^{-ix} \sin x$$

$$\Rightarrow y_h = c_1 \cos x + c_2 \sin x \text{ bulunur. Özel çözümleri için}$$

$$y_p = v_1 \cos x + v_2 \sin x \text{ kabul edelim. Böylece}$$

$$\left. \begin{aligned} v_1'(\cos x) + v_2'(\sin x) &= 0 \\ v_1'(-\sin x) + v_2'(\cos x) &= \frac{1}{\cos x} \end{aligned} \right\}$$

denklemleri elde edilir. Bu denklemleri sistemi Cramer metodu ile çözümlere

$$\Delta = \begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix} = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 0 & \sin x \\ \frac{1}{\cos x} & \cos x \end{vmatrix} = -\frac{\sin x}{\cos x} = -\tan x$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} \cos x & 0 \\ -\sin x & \frac{1}{\cos x} \end{vmatrix} = \frac{1}{\cos x}$$

$$\Rightarrow v_1' = \frac{\Delta_1}{\Delta} = -\tan x, \quad v_2' = \frac{\Delta_2}{\Delta} = 1$$

$$\Rightarrow v_1 = \int v_1' dx = \int -\tan x dx = -\int \frac{\sin x}{\cos x} dx = \ln |\cos x|$$

$$\Rightarrow v_2 = \int v_2' dx = \int 1 dx = x$$

$$\Rightarrow y_p = \ln |\cos x| \cdot \cos x + x \sin x$$

$$\Rightarrow y = y_h + y_p = c_1 \cos x + c_2 \sin x + \ln |\cos x| \cdot \cos x + x \sin x$$

genel çözümü bulunur.

(33)

4) $y'' - 3y' + 2y = \frac{1}{1+e^{-x}}$ denklemini çözünüz.

Çözüm: Parametrelerin değiştirilmesi metoduyla çözülür:

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$$

$y_h = c_1 e^{2x} + c_2 e^x$ homojen çözümü bulunur.

$y_p = v_1 e^{2x} + v_2 e^x$ özel çözüm olarak kabul edilirse

$$\left. \begin{aligned} v_1' e^{2x} + v_2' e^x &= 0 \\ v_1' 2e^{2x} + v_2' e^x &= \frac{1}{1+e^{-x}} \end{aligned} \right\}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} e^{2x} & e^x \\ 2e^{2x} & e^x \end{vmatrix} = -e^{3x}, \quad \Delta_1 = \begin{vmatrix} 0 & \frac{1}{1+e^{-x}} \\ e^{2x} & e^x \end{vmatrix} = -\frac{e^x}{1+e^{-x}}$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} e^{2x} & 0 \\ 2e^{2x} & \frac{1}{1+e^{-x}} \end{vmatrix} = \frac{e^{2x}}{1+e^{-x}}$$

$$\Rightarrow v_1' = \frac{\Delta_1}{\Delta} = -\frac{e^{-2x}}{1+e^{-x}}, \quad v_2' = \frac{\Delta_2}{\Delta} = -\frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow v_1 &= \int v_1' dx = -\int \frac{e^{-2x}}{1+e^{-x}} dx = -\left[\int \left(e^{-x} - \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} \right) dx \right] \\ &= -e^{-x} + \ln(1+e^{-x}) \end{aligned}$$

$$v_2 = \int v_2' dx = -\int \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} dx = -(-\ln(1+e^{-x})) = \ln(1+e^{-x})$$

$$\Rightarrow y_p = [-e^{-x} + \ln(1+e^{-x})] \cdot e^{2x} + \ln(1+e^{-x}) \cdot e^x$$

$$\Rightarrow y = y_h + y_p$$

$$\Rightarrow y = c_1 e^{2x} + c_2 e^x + [-e^{-x} + \ln(1+e^{-x})] \cdot e^{2x} + \ln(1+e^{-x}) \cdot e^x$$

genel çözümü bulunur.

(34)

8) $y'' + 4y' + 4y = \frac{e^{-2x}}{x^2}$ denkleminin çözümünü.

Çözüm: Parametrelerin değiştirilme yöntemiyle gözlemler:

$$\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0 \Rightarrow (\lambda + 2)^2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -2, \lambda_2 = -2.$$

$y_h = c_1 e^{-2x} + c_2 x e^{-2x}$ homojen çözümü bulunur.

$y_p = v_1 e^{-2x} + v_2 x e^{-2x}$ kabul edilirse

$$v_1' e^{-2x} + v_2' x e^{-2x} = 0$$

$$v_1' (-2e^{-2x}) + v_2' (e^{-2x} - 2xe^{-2x}) = \frac{e^{-2x}}{x^2}$$

denklemleri Cramer yöntemiyle gözlemler:

$$\Delta = \begin{vmatrix} e^{-2x} & x e^{-2x} \\ -2e^{-2x} & e^{-2x} - 2xe^{-2x} \end{vmatrix} = e^{-4x}$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 0 & x e^{-2x} \\ \frac{e^{-2x}}{x^2} & e^{-2x} - 2xe^{-2x} \end{vmatrix} = -\frac{e^{-4x}}{x}$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} e^{-2x} & 0 \\ -2e^{-2x} & \frac{e^{-2x}}{x^2} \end{vmatrix} = \frac{e^{-4x}}{x^2}$$

$$\Rightarrow v_1' = \frac{\Delta_1}{\Delta} = -\frac{1}{x}, \quad v_2' = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{1}{x^2}$$

$$\Rightarrow v_1 = \int v_1' dx = \int -\frac{1}{x} dx = -\ln x$$

$$\Rightarrow v_2 = \int v_2' dx = \int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow y_p = (-\ln x) \cdot e^{-2x} - \frac{1}{x} \cdot x e^{-2x}$$

$$\Rightarrow y = y_h + y_p = c_1 e^{-2x} + c_2 x e^{-2x} - e^{-2x} \ln x - e^{-2x}$$

genel çözümü bulunur.

(35)

9) $x^3 y''' + x y' - y = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm: Bu denklem Cauchy-Euler denklemdir. $x = e^t$ olmaktadır.

$$x^3 y''' = \frac{d^3 y}{dt^3} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} \quad \text{ve}$$

$$x y' = \frac{dy}{dt}$$

türevleri denkleme yerine yazarsa

$$\frac{d^3 y}{dt^3} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} + \frac{dy}{dt} - y = 0$$

$$\Rightarrow y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$$

$$\Rightarrow \lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda - 1 = 0$$

$$\Rightarrow (\lambda - 1)^3 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1 \quad \text{bulunur.}$$

0 halledi homojen çözümü

$$y = c_1 e^t + c_2 t e^t + c_3 t^2 e^t$$

$$y = c_1 x + c_2 (\ln x) \cdot x + c_3 (\ln x)^2 \cdot x$$

$$\Rightarrow y = x (c_1 + c_2 \ln x + c_3 (\ln x)^2)$$

şeklinde bulunur.

10) $x^2 y'' + 3x y' + 5y = 0$, $y(1) = 1$, $y'(1) = -3$

başlangıç değer problemini çözünüz.

Çözüm: Cauchy-Euler denklemdir. $x = e^t$ dön. yapalım:
 $\{ x = e^t \Rightarrow t = \ln x \}$

$$x^2 y'' = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \quad \text{ve} \quad x y' = \frac{dy}{dt}$$

türevleri denkleme yerlerine yazarsa

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} + 3 \frac{dy}{dt} + 5y = 0$$

(36)

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} + 5y = 0$$

$$\Rightarrow \lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-16}}{2} = -1 \pm 2i$$

$$\Rightarrow y = c_1 e^{-t} \cos 2t + c_2 e^{-t} \sin 2t$$

$$\Rightarrow y = c_1 \frac{1}{x} \cos(2 \ln x) + c_2 \frac{1}{x} \sin(2 \ln x)$$

homöjen qözüvü bulunur.

$y(1) = 1$ baqlangıç şartına göre $x=1$ ve $y=1$ oluving

$$1 = c_1 \cdot \frac{1}{1} \cos(2 \ln 1) + c_2 \cdot \frac{1}{1} \sin(2 \ln 1)$$

$$\Rightarrow 1 = c_1 + c_2 \cdot 0 \Rightarrow \boxed{c_1 = 1}$$
 bulunur.

$y'(1) = -3$ baqlangıç şartı için y' terevini almalıyız.

$$y' = c_1 \cdot \left[-\frac{1}{x^2} \cdot \cos(2 \ln x) - \frac{2}{x^2} \cdot \sin(2 \ln x) \right] + c_2 \cdot \left[-\frac{1}{x^2} \sin(2 \ln x) + \frac{2}{x^2} \cos(2 \ln x) \right]$$

$\Rightarrow x=1$ ve $y'=-3$ yazuluq

$$-3 = c_1 \cdot [-\cos(2 \ln 1) - 2 \cdot \sin(2 \ln 1)] + c_2 [-\sin(2 \ln 1) + 2 \cos(2 \ln 1)]$$

$$\Rightarrow -3 = -c_1 + 2c_2 \Rightarrow \boxed{c_2 = -1}$$

$c_1 = 0$ ve $c_2 = -1$ deęerleri genel qözüvde yerlerine

yazuluq $y = \frac{1}{x} [\cos(2 \ln x) - \sin(2 \ln x)]$, $x > 0$

bulunur.

5. BÖLÜM

(1)

LINEER DİF. DENKLEMLERİN KUVVET SERİLERİ CİNSİNDEN ÇÖZÜMÜ

ikinci mertebeden bir

$$b_2(x)y'' + b_1(x)y' + b_0(x)y = g(x) \quad \dots \quad (5.1)$$

linear dif. denklemleri $b_2(x)$, $b_1(x)$ ve $b_0(x)$ 'lerin tümünün sabit olmaması veya biri diğerinin sabit katı olmadığı durumda değişken katsayılarla sahiptir. Eğer verilen bir aralıta $b_2(x) \neq 0$ ise bu durumda (5.1) denklemini $b_2(x)$ ile bölerek,

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = \phi(x) \quad \dots \quad (5.2)$$

şeklinde yazabiliriz. Burada $p(x) = \frac{b_1(x)}{b_2(x)}$, $q(x) = \frac{b_0(x)}{b_2(x)}$ ve

$$\phi(x) = \frac{g(x)}{b_2(x)} \text{ tir}$$

$g(x) = 0$ olduğu zaman (5.1) denlemi homojendir ve bu durumda (5.2) denklemleri

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0 \quad \dots \quad (5.3)$$

özel durumunu alır.

TEOREM : Eğer $x=0$ noktası (5.3) denkleminin bir adi noktası ise, bu durumda bu noktayı içeren bir aralıta genel çözümü

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 y_1(x) + a_1 y_2(x) \quad \dots \quad (5.4)$$

biçimine sahiptir. Burada a_0 ve a_1 keyfi sabitlerdir. $y_1(x)$ ve $y_2(x)$ de $x=0$ noktasında analitik olan (türevlenebilen) lineer bağımlı fonksiyonlardır.

Teoreme oluşturulan çözümdeki an katsayılarını hesaplamak için, kuvvet serisi yöntemi olarak bilinen aşağıdaki beş adımı yolu kullanacağız.

(2)

1. Adım: Homojen dif. denklemin sol yanında

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + \dots + a_n x^n + a_{n+1} x^{n+1} + a_{n+2} x^{n+2} + \dots \quad (5.5)$$

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + 4a_4 x^3 + \dots + n a_n x^{n-1} + (n+1) a_{n+1} x^n + (n+2) a_{n+2} x^{n+1} + \dots \quad (5.6)$$

$$y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} = 2a_2 + 6a_3 x + 12a_4 x^2 + \dots + n(n-1) a_n x^{n-2} + (n+1)n a_{n+1} x^{n-1} + (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n + \dots \quad (5.7)$$

kuuvet serileri yazılır.

2. Adım: x 'in kuvvetleri düzenlenip, her bir kuvvetin katsayısı sıfıra eşitlenir.

3. Adım: 2. Adım'da x^n 'nin katsayılarını sıfıra eşitlemekle elde edilen denklem sonlu sayıdaki j değeri için a_j terimlerini içerecektir. Bu denklem en büyük indisi a_j terimine göre çözülür. Elde edilen denklem, verilen dif. denklemin rekürans (ginelem) formülü olarak bilinir.

4. Adım: Rekürans formülü kullanılarak a_j terimleri, a_0 ve a_1 cinsinden belirlenir.

5. Adım: 4. Adım'da belirlenen katsayılar (5.5)- ifadesinde yerine konup, çözümü (5.4) biçiminde yazılır.

NOT: Kuvvet serisi metodu, sadece $x=0$ bir adi noluata ise uygulanabilir. $x=0$ 'ın bir adi noluata olup olmadığını belirlemek için dif. denklemin (5.2) formunun kullanılması zorunluluğuna rağmen, bu belirlemeden sonra kuvvet serisi metodu (5.1) veya (5.2) formunun her ilisinde de kullanılabilir.

③

Homöjen olmayan Denklemlerin Orjin Komşuluğunda Çözümleri

Eğer (5.2) 'deki $\phi(x)$, $x=0$ 'da analitik ise, bu noktada komşuluğunda bir kuvvet serisi açılımına sahiptir ve yukarıda verilen kuvvet serisi metodu (5.1) veya (5.2) denklemini çözmek için düzenlenebilir.

1. Adım'da (5.5), (5.6) ve (5.7) serileri homöjen olmayan denklemin sol yanında yerlerine konulup sağ tarafın orjin komşuluğundaki kuvvet serisi yazılır.

2. Adım ve 3. Adım, x 'in 1. Adım'dan elde edilen eşitliğin sol tarafındaki katsayılarının, x 'in sağ tarafındaki katsayılarına eşitlenmesi şeklinde değiştirilir.

5. Adımdaki çözümü formülü

$$y = a_0 y_1(x) + a_1 y_2(x) + y_3(x)$$

biçimindedir.

Burada ilk iki terim, karşılık gelen homöjen dif. denklemin genel çözümünü verirken, son fonksiyon ise homöjen olmayan denklemin bir özel çözümünü elverişli göstermektedir.

Diğer Nokta Komşuluklarında Çözümler

$x_0 \neq 0$ adi noktası komşuluğundaki çözümler istendiğinde $t = x - x_0$ dönüşümü yapılarak x_0 noktasını orjine taşımak genellikle cebirsel işlemleri kolaylaştırır. Ortaya çıkan yeni dif. denklemin çözümü $t=0$ komşuluğunda kuvvet serisi metodu ile elde edilebilir. Böylece baştaki denklemin çözümü, geri dönüşümün yapılması ile kolayca elde edilir.

(4)

ÖRNEK : $y'' - xy' + 2y = 0$ denklemini çözüyoruz.

Çözüm : Burada $P(x) = -x$ ve $Q(x) = 2$ olup her ikisi de polinom old. her yerde analitiktir (Türevlenebilir). O halde x 'in her değeri ve özel olarak $x=0$ noktası bir adıdır noktasıdır.

Şimdi verilen dif. denklemin $x=0$ komşuluğundaki kuvvet serisi çözümünü için bir rekürrens formülü bulalım:

(5.5), (5.6) ve (5.7) dediği y, y', y'' değerlerini verilen

$$y'' - xy' + 2y = 0$$

denkleminde yerine yazalım:

$$[2a_2 + 6a_3x + 12a_4x^2 + 20a_5x^3 + \dots + (n+2)(n+1)a_{n+2} \cdot x^n + \dots]$$

$$-x \cdot [a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + 4a_4x^3 + \dots + na_nx^{n-1} + (n+1)a_{n+1}x^n + \dots] + 2[a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n + a_{n+1}x^{n+1} + a_{n+2}x^{n+2} + \dots] = 0$$

bulunur. x 'in kuvvetleri düzenlenirse

$$(2a_2 + 2a_0) + (6a_3 + a_1)x + (12a_4)x^2 + (20a_5 - a_3)x^3 + \dots + [(n+2)(n+1)a_{n+2} - na_n + 2a_n] + \dots = 0 + 0x + 0x^2 + \dots + 0x^n + \dots$$

olur. Buradan

$$2a_2 + 2a_0 = 0, \quad 6a_3 + a_1 = 0, \quad 12a_4 = 0, \quad 20a_5 - a_3 = 0, \dots$$

ve genel olarak

⑤

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} - na_n + 2a_n = 0$$

$$\Rightarrow a_{n+2} = \frac{(n-2)}{(n+2)(n+1)} \cdot a_n$$

elde edilir ki bu formül, verilen denklemin rekürans formülüdür.

$n = 0, 1, 2, 3, \dots$ değerleri için

$$a_2 = -a_0$$

$$a_3 = -\frac{1}{6}a_1$$

$$a_4 = 0$$

$$a_5 = \frac{1}{20}a_3 = \frac{1}{20}\left(-\frac{1}{6}a_1\right) = -\frac{1}{120}a_1$$

$$a_6 = \frac{2}{30}a_4 = \frac{1}{15} \cdot 0 = 0$$

$$a_7 = \frac{3}{42}a_5 = \frac{1}{14}\left(-\frac{1}{120}\right)a_1 = -\frac{1}{1680}a_1$$

$$a_8 = \frac{4}{56}a_6 = \frac{1}{14} \cdot 0 = 0$$

⋮

bulunur. Böylece

$$y = a_0 + a_1x - a_0x^2 - \frac{1}{6}a_1x^3 + 0 \cdot x^4 - \frac{1}{120}a_1x^5 + 0 \cdot x^6 - \frac{1}{1680}a_1x^7 + \dots$$

$$\Rightarrow y = a_0(1-x^2) + a_1\left(x - \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{120}x^5 - \frac{1}{1680}x^7 - \dots\right)$$

elde edilir.

ÖRNEK: $y'' + y = 0$ denkleminin $x=0$ konvergençindeki kuvvet serisi çözümlerini bulunuz.

Çözüm: (5.5) ve (5.7) serilerini denkleme yerine yazalım:

$$\begin{aligned} & [2a_2 + 6a_3x + 12a_4x^2 + 20a_5x^3 + \dots + (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n + \dots] \\ & + [a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n + \dots] = 0 \\ \Rightarrow & (2a_2 + a_0) + (6a_3 + a_1)x + (12a_4 + a_2)x^2 \\ & + (20a_5 + a_3)x^3 + [(n+2)(n+1)a_{n+2} + a_n]x^n + \dots = 0 \end{aligned}$$

bulunur. Buradan

$$2a_2 + a_0 = 0, \quad 6a_3 + a_1 = 0, \quad 12a_4 + a_2 = 0$$

$$20a_5 + a_3 = 0, \dots, (n+2)(n+1)a_{n+2} + a_n = 0$$

$$\Rightarrow a_{n+2} = \frac{-1}{(n+2)(n+1)} \cdot a_n$$

bulunur

$$a_2 = -\frac{1}{2}a_0,$$

$$a_3 = -\frac{1}{6}a_1 = -\frac{1}{3!}a_1$$

$$a_4 = -\frac{1}{4 \cdot 3}a_2 = \frac{1}{4!}a_0, \quad a_5 = -\frac{1}{5 \cdot 4}a_3 = \frac{1}{5!}a_1$$

$$a_6 = -\frac{1}{6 \cdot 5}a_4 = -\frac{1}{6!}a_0, \dots$$

Katıyıcıları bulunur ve bunlar $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ serisinde yerine yazılırsa

$$y = a_0 + a_1x - \frac{1}{2!}a_0x^2 - \frac{1}{3!}a_1x^3 + \frac{1}{4!}a_0x^4 + \frac{1}{5!}a_1x^5 - \frac{1}{6!}a_0x^6 + \dots$$

$$\Rightarrow y = a_0 \left(1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \dots\right) + a_1 \left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \dots\right)$$

seri çözümleri bulunur.

7

ÖRNEK: $(x^2+4)y'' + xy' = x+2$ denkleminin $x=0$ komşuluğundaki kuvvet serisi çözümünü bulunuz.

Çözüm: Verilen denklemin x^2+4 'e bölünürse payda x^2+4 geleceğinden daima pozitif olur. Sıfır olmaz. O halde $x=0$ bir adırlı noktadır.

$$(x^2+4) \cdot [2a_2 + 6a_3x + 12a_4x^2 + 20a_5x^3 + \dots + (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n + \dots]$$

$$+ x \cdot [a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n + \dots] = x+2$$

$$\Rightarrow (8a_2) + (24a_3 + a_0)x + (24a_4 + 48a_4 + a_1)x^2 + (6a_5 + 80a_5 + a_2)x^3 + \dots$$

$$\dots + [n(n-1)a_n + 4(n+2)(n+1)a_{n+2} + a_{n-1}]x^n + \dots = x+2$$

$$\Rightarrow 8a_2 = 2, \quad 24a_3 + a_0 = 1, \quad 24a_4 + 48a_4 + a_1 = 0, \quad 6a_5 + 80a_5 + a_2 = 0, \dots$$

$$\dots \quad n(n-1)a_n + 4(n+2)(n+1)a_{n+2} + a_{n-1} = 0$$

$$\Rightarrow a_{n+2} = -\frac{n(n-1)}{4(n+2)(n+1)} a_n - \frac{1}{4(n+2)(n+1)} a_{n-1}$$

eriştirilene denklemin x^0 ve x^1 'in katsayıları sıfır olmadığından rekürans formülünde $n=0$ ve $n=1$ geçersizdir.

$$8a_2 = 2 \Rightarrow a_2 = \frac{1}{4}, \quad 24a_3 + a_0 = 1 \Rightarrow a_3 = \frac{1}{24} - \frac{1}{24}a_0$$

bulunur.

$$n=2 \text{ için} \quad a_4 = -\frac{1}{24}a_2 - \frac{1}{48}a_1 = -\frac{1}{24}\left(\frac{1}{4}\right) - \frac{1}{48}a_1 = -\frac{1}{96} - \frac{1}{48}a_1$$

$$n=3 \text{ için} \quad a_5 = -\frac{3}{40}a_3 - \frac{1}{80}a_2 = -\frac{3}{40}\left(\frac{1}{24} - \frac{1}{24}a_0\right) - \frac{1}{80}\left(\frac{1}{4}\right)$$

$$\Rightarrow a_5 = -\frac{1}{160} + \frac{1}{320}a_0$$

bulunur. O halde

$$y = a_0 + a_1x + \frac{1}{4}x^2 + \left(\frac{1}{24} - \frac{1}{24}a_0\right)x^3 + \left(-\frac{1}{96} - \frac{1}{48}a_1\right)x^4 + \left(-\frac{1}{160} + \frac{1}{320}a_0\right)x^5 + \dots$$

kuvvet serisi çözümünü bulunur.

8

ÖRNEK: $\frac{d^2y}{dt^2} + (t-1)\frac{dy}{dt} + (2t-3)y = 0$ dif. denkleminin $t=0$ kökenliğindeki kuvvet serisi çözümünü için bir rekürans formülü bulunuz.

Gözüm: $P(t) = t-1$ ve $Q(t) = 2t-3$ polinom olup $t=0$ bir adi noktaadır. (5.5), (5.6) ve (5.7) serilerinde x yerine t alalım ve denkleme yerine yazalım:

$$\begin{aligned} & [2a_2 + 6a_3t + 12a_4t^2 + 20a_5t^3 + \dots + (n+2)(n+1)a_{n+2} \cdot t^n + \dots] \\ & + (t-1) [a_1 + 2a_2t + 3a_3t^2 + 4a_4t^3 + \dots + na_nt^{n-1} + (n+1)a_{n+1}t^n + \dots] \\ & + (2t-3) [a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + \dots + a_{n-1}t^{n-1} + a_nt^n + \dots] = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow & (2a_2 - a_1 - 3a_0) + (6a_3 + a_1 - 2a_2 + 2a_0 - 3a_1)t \\ & + (12a_4 + 2a_2 - 3a_3 + 2a_1 - 3a_2)t^2 + \dots + \\ & + ((n+2)(n+1)a_{n+2} + na_n - (n+1)a_{n+1} + 2a_{n-1} - 3a_n)t^n + \dots = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 2a_2 - a_1 - 3a_0 = 0, \quad 6a_3 + 2a_0 - 2a_2 - 2a_1 = 0,$$

$$12a_4 - 3a_3 - a_2 + 2a_1 = 0, \dots$$

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} - (n+1)a_{n+1} + (n-3)a_n + 2a_{n-1} = 0$$

olup buradan

$$a_{n+2} = \frac{1}{n+2} a_{n+1} - \frac{n-3}{(n+2)(n+1)} a_n - \frac{2}{(n+2)(n+1)} a_{n-1}$$

bulunur.

9

ÖRNEK: $y'' + xy' + (x^2 - 3)y = 0$ denkleminin $x=0$ temzeli-
ğündeki kuvvet serisi çözümünü bulunuz.

Çözüm: (Serileri ağımdan çözümü yapalım)

$x=0$ noktası denklemin bir adı noktası olduğundan genel çö-
zümleri

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad \text{ve} \quad y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} \quad (*)$$

den türevler ise

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

şeklinde dir. Bu terimler ve y serisi denkleme yerine yazılırsa

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} + \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^{n+2} - \sum_{n=2}^{\infty} 3a_n x^n = 0$$

olur. Burada bütün terimler için x in üssü aynı olacak

şekilde yukarıdaki denklemleri yeniden düzenlersek

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} + \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^{n+2} - \sum_{n=2}^{\infty} 3a_n x^n = 0 \quad (**)$$

olur. Şimdi de n indislerini aynı sayıdan ($n=2$ den) baş-

latmalıyız. Yani

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2} x^n = (0+2)(0+1)a_2 x^0 + (1+2)(1+1)a_3 x^1 + \sum_{n=2}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2} x^n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = 1.a_1 x^0 + \sum_{n=2}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} 3a_n x^n = 3a_0 x^0 + 3a_1 x^1 + \sum_{n=2}^{\infty} 3a_n x^n$$

şeklinde yeniden yazıp bunları $(**)$ eşitliğinde yerine yazalım:

(10)

$$2a_2 + 6a_3x + \sum_{n=2}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n + a_1x + a_1x + \sum_{n=2}^{\infty} na_nx^n + \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2}x^n$$

$$- 3a_0 - 3a_1x - \sum_{n=2}^{\infty} 3a_nx^n = 0$$

$$\Rightarrow (2a_2 - 3a_0) + (6a_3 - 2a_1)x + \sum_{n=2}^{\infty} \left[(n+2)(n+1)a_{n+2} + na_n + a_{n-2} - 3a_n \right] x^n = 0$$

elde edilir. Buradan

$$2a_2 - 3a_0 = 0$$

$$6a_3 - 2a_1 = 0$$

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} + (n-3)a_n + a_{n-2} = 0, \quad n \geq 2$$

bulunur. Buna göre

$$a_2 = \frac{3}{2}a_0 \quad \text{ve} \quad a_3 = \frac{1}{3}a_1$$

$$a_{n+2} = - \frac{(n-3)a_n + a_{n-2}}{(n+2)(n+1)}, \quad n \geq 2$$

rekürans formülü elde edilir. Böylece

$$n=2 \text{ için} \quad a_4 = - \frac{-a_2 + a_0}{12} = - \frac{-\frac{3}{2}a_0 + a_0}{12} = \frac{a_0}{24}$$

$$n=3 \text{ için} \quad a_5 = - \frac{a_1}{20}$$

$$n=4 \text{ için} \quad a_6 = - \frac{a_4 + a_2}{30} = - \frac{\frac{1}{24}a_0 + \frac{3}{2}a_0}{30} = - \frac{37}{720}a_0$$

$$n=5 \text{ için} \quad a_7 = - \frac{2a_5 + a_3}{42} = - \frac{2 \cdot \frac{1}{20}a_1 + \frac{1}{3}a_1}{42} = - \frac{a_1}{180}$$

;

$$y = a_0 + a_1x + \frac{3}{2}a_0x^2 + \frac{1}{3}a_1x^3 + \frac{1}{24}a_0x^4 - \frac{1}{20}a_1x^5 - \frac{37}{720}a_0x^6 - \frac{1}{180}a_1x^7 + \dots$$

kuvvet serisi çözümünü bulunur.

ÖRNEK : $xy'' + y' + 2y = 0$ denkleminin $x=1$ komşuluğundaki kuvvet serisi çözümünü bulunuz. (11)

Çözüm : Denklemin her iki tarafı y'' 'nin katsayısı olan x terimine bölünürse $y'' + \frac{y'}{x} + 2\frac{y}{x} = 0$ denklemini bulunur ki bu denklem $x=0$ noktasında tekildir. Yani $x=0$ noktası bir adi nokta olmayıp bir tekil noktadır. Dolayısıyla $x=0$ noktası civarında bir seri çözümü yoktur. $x=1$ noktası civarındaki çözümü ise

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$$

şekindedir. Bu nedenle $x-1=t$ dönüşümü yapılsa

$$(t+1) \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} + 2y = 0 \quad \dots \quad (*)$$

denklemini elde edilir. Bu denklemin $t=0$ noktası komşuluğundaki genel çözümü

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$$

şeklinde bir seri olup

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n t^{n-1} \quad \text{ve} \quad y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n t^{n-2} \quad \text{dir.}$$

Bu seriler $(*)$ denkleminde yerlerine yazılırsa

$$(t+1) \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n t^{n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} n a_n t^{n-1} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n = 0$$

olar. Bu denklemin düzenlenirse

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n t^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} n a_n t^{n-1} + \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n t^{n-2} + \sum_{n=0}^{\infty} 2 a_n t^n = 0 \dots (*)$$

olar. t 'lerin kuvvetlerini eşitleyerek aynı t^n yapmak için

(12)

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n t^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)n a_{n+1} t^n \quad (n \text{ yerine } n+1 \text{ yazıldı})$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n t^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} t^n \quad (n \text{ yerine } n+1 \text{ yazıldı})$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n t^{n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2} t^n \quad (n \text{ yerine } n+2 \text{ yazıldı})$$

serileri (*) eşitliğinde yerlerine yazılırsa

$$\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)n a_{n+1} t^n + \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1} t^n + \sum_{n=0}^{\infty} 2a_n t^n = 0$$

olur. Şimdi de n indislerini $n=1$ den başlatalım:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)n a_{n+1} t^n + (a_1 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)a_{n+1} t^n) + \\ + (2a_2 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2} t^n) + 2a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} 2a_n t^n = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow a_1 + 2a_2 + 2a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [(n+1)n a_{n+1} + (n+1)a_{n+1} + (n+2)(n+1)a_{n+2} + 2a_n] t^n = 0$$

$$\Rightarrow a_1 + 2a_2 + 2a_0 = 0 \text{ ve } (n+1)n a_{n+1} + (n+1)a_{n+1} + (n+2)(n+1)a_{n+2} + 2a_n = 0$$

$$\Rightarrow a_{n+2} = - \frac{(n+1)^2 a_{n+1} + 2a_n}{(n+1) \cdot (n+2)}, \quad n \geq 1$$

$$n=1 \quad 1a_1n \quad a_3 = - \frac{4a_2 + 2a_1}{2 \cdot 3} = - \frac{2a_0}{3}$$

$$n=2 \quad 1a_1n \quad a_4 = - \frac{9a_3 + 2a_2}{3 \cdot 4} = - \frac{4a_0 - a_1}{12}$$

$$n=3 \quad 1a_1n \quad a_5 = - \frac{16a_4 + 2a_3}{4 \cdot 5} = - \frac{3a_0 - a_1}{15}$$

! !
katsayıları bulunur ve bunları $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ serisinde yerine yazarsak

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n = a_0 + a_1 t + (-a_0 - \frac{a_1}{2}) t^2 + \frac{2a_0 t^3}{3} + \frac{-4a_0 + a_1 t^4}{12} + \dots$$

ve t yerine $x-1$ yazılırsa

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1) + (-a_0 - \frac{a_1}{2})(x-1)^2 + \frac{2a_0}{3}(x-1)^3 + \frac{-4a_0 + a_1}{12}(x-1)^4 + \dots$$

kuvvet serisi görünümü bulunur.

(13)

ÖRNEK : $(x^2+1)y'' + xy' + 2xy = 0$ denkleminin $x=0$ noluası komzuluğundaki kuvvet serisi çözümlünü bulunuz.

Çözüm : $x=0$ noluası denklemin bir adı noluasıdır. Buna göre $x=0$ noluası komzuluğunda kuvvet serisi çözümlü vardır.

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \quad y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$$

serileri denklemede yerlerine yazılırsa

$$(x^2+1) \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + x \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} + 2x \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^n + \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 2 a_n x^{n+1} = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_n x^n + \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n + \sum_{n=1}^{\infty} 2 a_{n-1} x^n = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^n + (2a_2 + 6a_3 x + \sum_{n=2}^{\infty} (n+2)(n+1) a_n x^n) + (a_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} n a_n x^n) + (2a_0 x + \sum_{n=2}^{\infty} 2 a_{n-1} x^n) = 0$$

$$\Rightarrow \underbrace{2a_2 + (6a_3 + a_1 + 2a_0)x}_{=0} + \sum_{n=2}^{\infty} \underbrace{[n(n-1)a_n + (n+2)(n+1)a_n + na_n + 2a_{n-1}]}_{=0} x^n = 0$$

$$2a_2 = 0, \quad 6a_3 + a_1 + 2a_0 = 0, \quad n^2 a_n + 2a_{n-1} + (n+2)(n+1)a_n = 0$$

$$\Rightarrow a_2 = 0, \quad a_3 = -\frac{1}{3}a_0 - \frac{1}{6}a_1, \quad \dots, \quad a_{n+2} = -\frac{n^2 a_n + 2a_{n-1}}{(n+2)(n+1)}$$

$$\Rightarrow a_4 = -\frac{1}{6}a_1, \quad a_5 = \frac{3}{20}a_0 + \frac{3}{40}a_1, \quad \dots$$

$$\Rightarrow y = a_0 + a_1 x + \left(-\frac{1}{3}a_0 - \frac{1}{6}a_1\right)x^3 + \left(-\frac{1}{6}a_1\right)x^4 + \left(\frac{3}{20}a_0 + \frac{3}{40}a_1\right)x^5 + \dots$$

kuvvet serisi çözümlü bulunur.

ALL ONE

6. BÖLÜM

LAPLACE DÖNÜŞÜMLERİ

Tanım: $f(x)$, $0 \leq x < \infty$ için tanımlı olsun. ve s keyfi bir reel değişkeni gösterebilir. $f(x)$ 'in $L\{f(x)\}$ veya $F(s)$ ile gösterilen Laplace dönüşümü

$$L\{f(x)\} = F(s) = \int_0^{\infty} e^{-sx} \cdot f(x) dx$$

ile verilir. Burada

$$\int_0^{\infty} e^{-sx} f(x) dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R e^{-sx} f(x) dx$$

şeklinde tanımlı limit varsa $f(x)$ 'in Laplace dönüşümü vardır. Aksi halde Laplace dönüşümü yoktur.

Laplace Dönüşümünün Özellikleri

(1) $L\{f(x)\} = F(s)$ ve $L\{g(x)\} = G(s)$ ise 0 zaman herhangi iki c_1 ve c_2 sabit için

$$L\{c_1 f(x) + c_2 g(x)\} = c_1 L\{f(x)\} + c_2 L\{g(x)\} \quad \text{dir.}$$

(2) $L\{f(x)\} = F(s)$ ise herhangi bir α sabit için

$$L\{e^{\alpha x} f(x)\} = F(s - \alpha)$$

(3) $L\{f(x)\} = F(s)$ ise $n \in \mathbb{Z}^+$ için

$$L\{x^n f(x)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} [F(s)]$$

(4) $L\{f(x)\} = F(s)$ ise $L\{\frac{1}{x} f(x)\} = \int_s^{\infty} F(t) dt$

(5) $L\{f(x)\} = F(s)$ ise $L\left\{\int_0^x f(t) dt\right\} = \frac{1}{s} F(s)$ dir.

(2)

ÖRNEK: $f(x)=1$ fonksiyonunun Laplace dönüşümünü bulunuz.

Çözüm: $L\{1\} = F(s)$ olarak yazarsak $L\{1\} = ?$

$$F(s) = L\{1\} = \int_0^{\infty} e^{-sx} \cdot 1 \cdot dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R e^{-sx} \cdot 1 \cdot dx \quad \text{dir.}$$

$$\int_0^R e^{-sx} dx \text{ integralinde } -sx = u \text{ olsun. } -s dx = du \Rightarrow dx = -\frac{du}{s}$$

$$\Rightarrow \int_0^R e^{-sx} dx = -\frac{1}{s} \int_0^R e^u du = -\frac{1}{s} e^u \Big|_{x=0}^{x=R} = -\frac{1}{s} e^{-sx} \Big|_0^R$$

$$= -\frac{1}{s} e^{-sR} - \left(-\frac{1}{s} e^{-s \cdot 0} \right) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s} e^{-sR} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s e^{sR}}$$

$$\Rightarrow \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R e^{-sx} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s e^{sR}} \right) = \frac{1}{s} \quad \text{olur.}$$

$$0 \text{ haride } L\{1\} = \frac{1}{s} \quad \text{dir. } (s > 0)$$

ÖRNEK: $L\{e^{ax}\} = ?$

$$\text{Çözüm: } L\{e^{ax}\} = \int_0^{\infty} e^{-sx} \cdot e^{ax} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R e^{(a-s)x} dx$$

$$\Rightarrow (a-s)x = u \Rightarrow (a-s)dx = du \Rightarrow dx = \frac{du}{a-s} \quad x=R$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R e^{(a-s)x} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \frac{e^u du}{a-s} = \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\frac{e^{(a-s)x}}{a-s} \right)_{x=0}^{x=R}$$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\frac{e^{(a-s)R}}{a-s} - \frac{e^{(a-s) \cdot 0}}{a-s} \right) = \lim_{R \rightarrow \infty} \left[\frac{e^{(a-s)R} - 1}{a-s} \right]$$

$$= \frac{1}{s-a} \quad (s > a \text{ için})$$

3

Bazı Laplace Dönüşümleri

	$f(x)$	$L\{f(x)\} = F(s)$
1	1	$\frac{1}{s}$
2	x	$\frac{1}{s^2}$
3	x^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
4	$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2} \sqrt{\pi} s^{-3/2}$
5	e^{ax}	$\frac{1}{s-a}$
6	$\sin ax$	$\frac{a}{s^2+a^2}$
7	$\cos ax$	$\frac{s}{s^2+a^2}$
8	$e^{bx} \cdot \sin ax$	$\frac{a}{(s-b)^2+a^2}$
9	$e^{bx} \cdot \cos ax$	$\frac{s-b}{(s-b)^2+a^2}$
10	$x \cdot \sin ax$	$\frac{2as}{(s^2+a^2)^2}$
11	$x \cdot \cos ax$	$\frac{s^2-a^2}{(s^2+a^2)^2}$
12	$x^n \cdot e^{ax}$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$
13	$\sin^2 ax$	$\frac{2a^2}{s(s^2+4a^2)}$
14	$\sin ax - ax \cos ax$	$\frac{2a^3}{(s^2+a^2)^2}$

4

ÖRNEK : $L\{3+2x^2\} = ?$

Çözüm : $L\{3+2x^2\} = L\{3 \cdot 1\} + L\{2x^2\}$
 $= 3L\{1\} + 2L\{x^2\} = 3 \cdot \left(\frac{1}{s}\right) + 2 \cdot \left(\frac{2}{s^3}\right) = \frac{3}{s} + \frac{4}{s^3}$

ÖRNEK : $L\{5\sin 3x - 17e^{-2x}\} = ?$

Çözüm : $L\{5\sin 3x - 17e^{-2x}\} = 5L\{\sin 3x\} - 17L\{e^{-2x}\}$
 $= 5 \cdot \left(\frac{3}{s^2+3^2}\right) - 17 \cdot \left(\frac{1}{s-(-2)}\right) = \frac{15}{s^2+9} - \frac{17}{s+2}$

ÖRNEK : $L\{2\sin x + 3\cos 2x\} = ?$

Çözüm : $L\{2\sin x + 3\cos 2x\} = 2L\{\sin x\} + 3L\{\cos 2x\}$
 $= 2 \cdot \frac{1}{s^2+1^2} + 3 \cdot \frac{s}{s^2+2^2} = \frac{2}{s^2+1} + \frac{3s}{s^2+4}$

ÖRNEK : $L\{xe^{4x}\} = ?$

Çözüm : (I) : 12. formüle $n=1$, $a=4$ alınırsa

$$L\{xe^{4x}\} = \frac{1}{(s-4)^2}$$

(II) : 2. özellik kullanılırsa $L\{e^{ax} f(x)\} = F(s-a)$ idi.

$$F(s) = L\{f(x)\} = L\{x\} = \frac{1}{s^2}$$

ve

$$L\{e^{4x} \cdot x\} = F(s-4) = \frac{1}{(s-4)^2}$$

bulunur.

5

ÖRNEK: $L\{e^{-2x} \cdot \sin 5x\} = ?$

Çözüm (I): Tabloda 8. formüle $b = -2$ ve $a = 5$ için

$$L\{e^{-2x} \sin 5x\} = \frac{5}{[s - (-2)]^2 + 5^2} = \frac{5}{(s+2)^2 + 25}$$

(II): $L\{\sin 5x\} = \frac{5}{s^2 + 25}$ ve

$$L\{e^{-2x} \sin 5x\} = F(s - (-2)) = F(s+2) = \frac{5}{(s+2)^2 + 25}$$

ÖRNEK: $L\{x \cos \sqrt{7} x\} = ?$

Çözüm (I): Tabloda 11. formüle $a = \sqrt{7}$ alınır

$$L\{x \cos \sqrt{7} x\} = \frac{s^2 - (\sqrt{7})^2}{[s^2 + (\sqrt{7})^2]^2} = \frac{s^2 - 7}{(s^2 + 7)^2}$$

(II): $L\{\cos \sqrt{7} x\} = \frac{s}{s^2 + (\sqrt{7})^2} = \frac{s}{s^2 + 7}$

ve

$$L\{x \cos \sqrt{7} x\} = -\frac{d}{ds} \left(\frac{s}{s^2 + 7} \right) = \frac{s^2 - 7}{(s^2 + 7)^2}$$

ÖRNEK: $L\{e^{-x} \cdot x \cos 2x\} = ?$

Çözüm: $L\{x \cos 2x\} = \frac{s^2 - 4}{(s^2 + 4)^2}$ dir.

$$L\{e^{-x} x \cos 2x\} = \frac{(s+1)^2 - 4}{[(s+1)^2 + 4]^2}$$

(6)

ÖRNEK : $L \left\{ \frac{\sin 3x}{x} \right\} = ?$

Çözüm : $f(x) = \sin 3x$ alınırsa

$$F(s) = \frac{3}{s^2 + 9} \quad \text{veya} \quad F(t) = \frac{3}{t^2 + 9} \quad \text{bulunur.}$$

4. özellik kullanılırsa

$$L \left\{ \frac{\sin 3x}{x} \right\} = \int_s^{\infty} \frac{3}{t^2 + 9} dt = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_s^R \frac{3}{t^2 + 9} dt$$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \arctan \frac{t}{3} \Big|_s^R = \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\arctan \frac{R}{3} - \arctan \frac{s}{3} \right)$$

$$= \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{s}{3}$$

TERS LAPLACE DÖNÜŞÜMLERİ

$F(s)$ nin $L^{-1}\{F(s)\}$ ile gösterilen ters Laplace dönüşümü $L\{f(x)\} = F(s)$ özelliğine sahip bir $f(x)$ fonksiyondur.

Eğer $F(s)$ belirli biçimlerden birine sahip değilse bazen cebirsel işlemlerle böyle bir biçime dönüştürülebilir.

Paydalar genellikle iki metotla bilinen biçimlere dönösterülür. Bunlar kareye tamamlama ve Basit kesirler metodudur.

Kareye tamamlama metodunda, paydadaki polinom karelerin toplamı şeklinde yazılmaya çalışılır.

Basit kesirler metodunda $\frac{a(s)}{b(s)}$ biçimindeki bir fonksiyon

diğer kesirlerin toplamı haline çevrilir. Eğer $b(s)$ ifadesi

$(s-a)^m$ şeklindeyse

$$\frac{A_1}{s-a} + \frac{A_2}{(s-a)^2} + \dots + \frac{A_n}{(s-a)^n}$$

şeklinde kesirler toplamı atanır.

7

ÖRNEK : $L^{-1} \left\{ \frac{1}{s} \right\} = ?$

Çözüm : $L \{ 1 \} = \frac{1}{s}$ olduğundan $L^{-1} \left\{ \frac{1}{s} \right\} = 1$ dir.

ÖRNEK : $L^{-1} \left\{ \frac{1}{s-8} \right\} = ?$

Çözüm : $L \{ e^{8x} \} = \frac{1}{s-8}$ olduğundan $L^{-1} \left\{ \frac{1}{s-8} \right\} = e^{8x}$ dir.

ÖRNEK : $L^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2+6} \right\} = ?$

Çözüm : $L \{ \cos \sqrt{6} x \} = \frac{s}{s^2 + (\sqrt{6})^2} = \frac{s}{s^2 + 6}$ old.

$L^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2+6} \right\} = \cos \sqrt{6} x$ dir.

ÖRNEK : $L^{-1} \left\{ \frac{5s}{(s^2+1)^2} \right\} = ?$

Çözüm : $L^{-1} \left\{ \frac{5s}{(s^2+1)^2} \right\} = L^{-1} \left\{ \frac{\frac{5}{2} \cdot 2s}{(s^2+1)^2} \right\}$

$= \frac{5}{2} \cdot L^{-1} \left\{ \frac{2s}{(s^2+1)^2} \right\} = \frac{5}{2} x \sin x$

ÖRNEK : $L^{-1} \left\{ \frac{s+1}{s^2+9} \right\} = ?$

Çözüm : $L^{-1} \left\{ \frac{s+1}{s^2+9} \right\} = L^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2+9} \right\} + L^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2+9} \right\}$

$= \cos 3x + L^{-1} \left\{ \frac{1}{3} \frac{3}{s^2+9} \right\}$

$= \cos 3x + \frac{1}{3} \sin 3x$

8

ÖRNEK: $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{(s-2)^2+9} \right\} = ?$

Çözüm:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{(s-2)^2+9} \right\} &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{(s-2)+2}{(s-2)^2+9} \right\} \\ &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s-2}{(s-2)^2+9} \right\} + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{(s-2)^2+9} \right\} \\ &= e^{2x} \cos 3x + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{(s-2)^2+9} \right\} \\ &= e^{2x} \cos 3x + \frac{2}{3} e^{2x} \sin 3x \end{aligned}$$

ÖRNEK: $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2-2s+9} \right\} = ?$

Çözüm: $s^2-2s+9 = (s^2-2s+1)+8$
 $= (s-1)^2+8 = (s-1)^2+(\sqrt{8})^2$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2-2s+9} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s-1)^2+(\sqrt{8})^2} \right\}$$

$$= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{\sqrt{8}} \cdot \frac{\sqrt{8}}{(s-1)^2+(\sqrt{8})^2} \right\}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{8}} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\sqrt{8}}{(s-1)^2+(\sqrt{8})^2} \right\}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{8}} \cdot e^x \sin \sqrt{8} x$$

9)

ÖRNEK: $L^{-1} \left\{ \frac{s+2}{s^2-3s+4} \right\} = ?$

$\swarrow 4 - \frac{9}{4} = \frac{7}{4}$

Çözüm: $s^2 - 3s + 4 = (s^2 - 3s + \frac{9}{4}) + \frac{7}{4} = (s - \frac{3}{2})^2 + (\frac{\sqrt{7}}{2})^2$

$$L^{-1} \left\{ \frac{s+2}{s^2-3s+4} \right\} = L^{-1} \left\{ \frac{s+2}{(s-\frac{3}{2})^2 + (\frac{\sqrt{7}}{2})^2} \right\}$$

$$= L^{-1} \left\{ \frac{s - \frac{3}{2} + \frac{7}{2}}{(s-\frac{3}{2})^2 + (\frac{\sqrt{7}}{2})^2} \right\} = L^{-1} \left\{ \frac{s - \frac{3}{2}}{(s-\frac{3}{2})^2 + (\frac{\sqrt{7}}{2})^2} \right\} + L^{-1} \left\{ \frac{\frac{7}{2}}{(s-\frac{3}{2})^2 + (\frac{\sqrt{7}}{2})^2} \right\}$$

$$= L^{-1} \left\{ \frac{s - \frac{3}{2}}{(s-\frac{3}{2})^2 + (\frac{\sqrt{7}}{2})^2} \right\} + \sqrt{7} \cdot L^{-1} \left\{ \frac{\frac{\sqrt{7}}{2}}{(s-\frac{3}{2})^2 + (\frac{\sqrt{7}}{2})^2} \right\}$$

$$= e^{\frac{3}{2}x} \cos \frac{\sqrt{7}}{2} x + \sqrt{7} e^{\frac{3}{2}x} \sin \frac{\sqrt{7}}{2} x$$

ÖRNEK: $L^{-1} \left\{ \frac{s+3}{(s-2)(s+1)} \right\} = ?$

Çözüm: $\frac{s+3}{(s-2)(s+1)} \equiv \frac{A}{s-2} + \frac{B}{s+1}$

$$s+3 \equiv A(s+1) + B(s-2) = (A+B)s + A-2B \Rightarrow A = \frac{5}{3}, B = -\frac{2}{3}$$

$$L^{-1} \left\{ \frac{s+3}{(s-2)(s+1)} \right\} = L^{-1} \left\{ \frac{\frac{5}{3}}{s-2} + \frac{-\frac{2}{3}}{s+1} \right\}$$

$$= \frac{5}{3} L^{-1} \left\{ \frac{1}{s-2} \right\} - \frac{2}{3} L^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1} \right\}$$

$$= \frac{5}{3} e^{2x} - \frac{2}{3} e^{-x}$$

10

ÖRNEK: $L^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+1)(s^2+1)} \right\} = ?$

Çözüm: $\frac{1}{(s+1)(s^2+1)} \equiv \frac{A}{s+1} + \frac{Bs+C}{s^2+1}$

$$1 \equiv A(s^2+1) + (Bs+C)(s+1) = \underbrace{(A+B)}_{=0} s^2 + \underbrace{(B+C)}_{=0} s + \underbrace{(A+C)}_{=1}$$

$A = \frac{1}{2}, B = -\frac{1}{2}, C = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} L^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+1)(s^2+1)} \right\} &= L^{-1} \left\{ \frac{\frac{1}{2}}{s+1} \right\} + L^{-1} \left\{ \frac{-\frac{1}{2}s + \frac{1}{2}}{s^2+1} \right\} \\ &= \frac{1}{2} L^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1} \right\} - \frac{1}{2} L^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2+1} \right\} + \frac{1}{2} L^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2+1} \right\} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} e^{-x} - \frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{2} \sin x$$

ÖRNEK: $L^{-1} \left\{ \frac{1}{s(s^2+4)} \right\} = ?$

Çözüm: $\frac{1}{s(s^2+4)} \equiv \frac{A}{s} + \frac{Bs+C}{s^2+4}$

$$1 \equiv A(s^2+4) + (Bs+C) \cdot s$$

$$1 \equiv (A+B)s^2 + Cs + 4A \Rightarrow A = \frac{1}{4}, B = -\frac{1}{4}, C = 0$$

$$\frac{1}{s(s^2+4)} = \frac{\frac{1}{4}}{s} + \frac{(-\frac{1}{4})s}{s^2+4}$$

$$L^{-1} \left\{ \frac{1}{s(s^2+4)} \right\} = \frac{1}{4} L^{-1} \left\{ \frac{1}{s} \right\} - \frac{1}{4} L^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2+4} \right\}$$

$$= \frac{1}{4} \cdot 1 - \frac{1}{4} \cos 2x$$

(11)

ÖRNEK : $L^{-1} \left\{ \frac{8}{s^3(s^2-s-2)} \right\} = ?$

Çözüm : $s^2-s-2 = (s-2)(s+1)$ old.

$$\frac{8}{s^3(s^2-s-2)} = \frac{8}{s^3(s-2)(s+1)} \equiv \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s^3} + \frac{D}{s-2} + \frac{E}{s+1}$$

$$8 \equiv A s^2(s-2)(s+1) + B s(s-2)(s+1) + C(s-2)(s+1) + D s^3(s+1) + E s^3(s-2)$$

Sırayla $s=-1$, $s=2$ ve $s=0$ alınırsa

$$E = \frac{8}{3}, \quad D = \frac{1}{3} \quad \text{ve} \quad C = -4 \quad \text{elde edilir.}$$

Daha sonra $s=1$ ve $s=-2$ alınırsa ($s=-1, 2, 0$ hariç)

$$A+B=-1 \quad \text{ve} \quad 2A-B=-8$$

$$\Rightarrow A=3 \quad \text{ve} \quad B=2 \quad \text{bulunur.}$$

$$\frac{8}{s^3(s^2-s-2)} = -\frac{3}{s} + \frac{2}{s^2} - \frac{4}{s^3} + \frac{\frac{1}{3}}{s-2} + \frac{\frac{8}{3}}{s+1}$$

$$\Rightarrow L^{-1} \left\{ \frac{8}{s^3(s^2-s-2)} \right\} = -3 L^{-1} \left\{ \frac{1}{s} \right\} + 2 L^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2} \right\} - 2 L^{-1} \left\{ \frac{2}{s^3} \right\} + \frac{1}{3} L^{-1} \left\{ \frac{1}{s-2} \right\} + \frac{8}{3} L^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1} \right\}$$

$$= -3 + 2x - 2x^2 + \frac{1}{3}e^{2x} + \frac{8}{3}e^{-x}$$

(12)

SABİT KATSAYILI LİNEER DİF. DENKLEMLERİN LAPLACE DÖNÜŞÜMLERİ İLE ÇÖZÜMLERİ

Türevlerin Laplace Dönüşümleri

$L\{y(x)\}$ 'i $Y(s)$ ile gösterelim. Bu durumda çok genel koşullar altında $y(x)$ 'in n -yinci türevinin Laplace dönüşümü

$$L\{y^{(n)}\} = s^n Y(s) - s^{n-1} y(0) - s^{n-2} y'(0) - \dots - s y^{(n-2)}(0) - y^{(n-1)}(0) \quad (6.1)$$

← (Sadece $x=0$ 'daki koşullar veriliyor)

dır. Eğer $x=0$ 'da $y(x)$ üzerindeki başlangıç koşulları

$$y(0) = c_0, \quad y'(0) = c_1, \dots, y^{(n-1)}(0) = c_{n-1} \quad (6.2)$$

şeklinde veriliyorsa bu durumda

$$L\{y^{(n)}\} = s^n Y(s) - c_0 s^{n-1} - c_1 s^{n-2} - \dots - c_{n-2} s - c_{n-1} \quad (6.3)$$

olarak yazılabilir.

$n=1$ ve $n=2$ özel durumları için

$$L\{y'(x)\} = sY(s) - c_0 \quad (6.4)$$

$$L\{y''(x)\} = s^2 Y(s) - c_0 s - c_1 \quad (6.5)$$

eşitlikleri elde edilir. $\{L\{y(x)\} = Y(s)$ şeklindeydi.

Diferansiyel Denklemlerin Çözümleri

Laplace dönüşümleri, başlangıç koşulları belirlenen n -yinci mert.

sabit katsayılı lineer dif. denklemleri

$$b_n y^{(n)} + b_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + b_1 y' + b_0 y = g(x) \quad (6.6)$$

ile verilen başlangıç değer problemini çözmek için kullanılır. Örnekle

(6.6) denkleminin her iki tarafının Laplace dönüşümü alınıp

$Y(s)$ için bir cebirsel denklem elde edilir. Daha sonra bundan

lem $Y(s)$ için çözülür ve son olarak da $y(x) = L^{-1}\{Y(s)\}$ çözümleri elde etmek için ters Laplace dönüşümü alınır.

ÖRNEK: $y' - 5y = 0$, $y(0) = 2$ bağımlı değer problemi çözünüz.

Çözüm: $y' - 5y = 0$ denkleminin her iki tarafının Laplace dönüşümü alınır.

$$L\{y'\} - 5L\{y\} = L\{0\}$$

elde edilir. $C_0 = 2$ olarak üzere (6.4) eşitliği kullanılırsa

$$[sY(s) - 2] - 5Y(s) = 0$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{2}{s-5}$$

bulunur. Son olarak $Y(s)$ nin ters Laplace dönüşümü alınır.

$$\begin{aligned} y(x) &= L^{-1}\{Y(s)\} = L^{-1}\left\{\frac{2}{s-5}\right\} \\ &= 2L^{-1}\left\{\frac{1}{s-5}\right\} = 2e^{5x} \end{aligned}$$

bulunur.

ÖRNEK: $y' - 5y = e^{5x}$, $y(0) = 0$ bağımlı değer problemi çözünüz.

Çözüm: Denklemin her iki tarafının Laplace dönüşümü alınır. $C_0 = 0$ için (6.4) eşitliği kullanılırsa

$$L\{y'\} - 5L\{y\} = L\{e^{5x}\}$$

$$[sY(s) - 0] - 5Y(s) = \frac{1}{s-5}$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{1}{(s-5)^2} \quad \text{bulunur.}$$

$$\Rightarrow y(x) = L^{-1}\{Y(s)\} = L^{-1}\left\{\frac{1}{(s-5)^2}\right\} = x e^{5x} \quad \text{elde edilir.}$$

(14)

ÖRNEK: $y' + y = \sin x$, $y(0) = 1$ problemi çözünüz.

Çözüm:

$$L\{y'\} + L\{y\} = L\{\sin x\}$$

$$\Rightarrow [sY(s) - 1] + Y(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2+1)} + \frac{1}{s+1}$$

$$\Rightarrow y(x) = L^{-1}\{Y(s)\} = L^{-1}\left\{\frac{1}{(s+1)(s^2+1)}\right\} + L^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\}$$

$$= \left(\frac{1}{2}e^{-x} - \frac{1}{2}\cos x + \frac{1}{2}\sin x\right) + e^{-x}$$

ÖRNEK: $y'' + 4y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 2$ prob. çözünüz.

Çözüm: $L\{y''\} + 4L\{y\} = L\{0\}$

$c_0 = 2$ ve $c_1 = 2$ için (6.5) eşitliği kullanırsak

$$[s^2 Y(s) - 2s - 2] + 4Y(s) = 0$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{2s+2}{s^2+4} = \frac{2s}{s^2+4} + \frac{2}{s^2+4}$$

$$\Rightarrow y(x) = L^{-1}\{Y(s)\} = 2L^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+4}\right\} + L^{-1}\left\{\frac{2}{s^2+4}\right\}$$

$$= 2 \cos 2x + \sin 2x$$

bulunur.

(15)

ÖRNEK: $y'' - 3y' + 4y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 5$

problemini çözünüz.

Çözüm: $L\{y''\} - 3L\{y'\} + 4L\{y\} = L\{0\}$

$C_0 = 1$ ve $C_1 = 5$ için (6.4) ve (6.5) den

$$[s^2 Y(s) - s - 5] - 3[sY(s) - 1] + 4Y(s) = 0$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{s+2}{s^2-3s+4}$$

bulunur.

$$\begin{aligned} y(x) &= L^{-1}\{Y(s)\} = L^{-1}\left\{\frac{s+2}{s^2-3s+4}\right\} \\ &= e^{\frac{3}{2}x} \cos \frac{\sqrt{5}}{2}x + \sqrt{5}e^{\frac{3}{2}x} \sin \frac{\sqrt{5}}{2}x \end{aligned}$$

ÖRNEK: $y'' - y' - 2y = 4x^2$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 4$ problemi

çözünüz.

Çözüm: $L\{y''\} - L\{y'\} - 2L\{y\} = 4L\{x^2\}$

$C_0 = 1$ ve $C_1 = 4$ için

$$[s^2 Y(s) - s - 4] - [sY(s) - 1] - 2Y(s) = \frac{8}{s^3}$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{s+3}{s^2-s-2} + \frac{8}{s^3(s^2-s-2)}$$

$$\Rightarrow y(x) = L^{-1}\{Y(s)\} = L^{-1}\left\{\frac{s+3}{s^2-s-2}\right\} + L^{-1}\left\{\frac{8}{s^3(s^2-s-2)}\right\}$$

$$\Rightarrow y(x) = \left(\frac{5}{3}e^{2x} - \frac{2}{3}e^{-x}\right) + \left(-3 + 2x - 2x^2 + \frac{1}{3}e^{2x} + \frac{8}{3}e^{-x}\right)$$

$$\Rightarrow y(x) = 2e^{2x} + 2e^{-x} - 2x^2 + 2x - 3$$

çözümü bulunur.

ÖRNEK: $y''' + y' = e^x$, $y(0) = y'(0) = y''(0) = 0$
başlangıç değer problemini çözünüz.

Çözüm: $L\{y'''\} + L\{y'\} = L\{e^x\}$

(6.4) eşitliği $n=3$ için kullanılırsa

$$[s^3 Y(s) - 0 \cdot s^2 - 0 \cdot s - 0] + [s Y(s) - 0] = \frac{1}{s-1}$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{1}{(s-1)(s^3+s)}$$

elde edilir. Buradan

$$y(x) = L^{-1}\{Y(s)\} = L^{-1}\left\{\frac{1}{s(s-1)(s^2+1)}\right\}$$

$$= L^{-1}\left\{\frac{A}{s} + \frac{B}{s-1} + \frac{Cs+D}{s^2+1}\right\}$$

$$\Rightarrow A = -1, B = \frac{1}{2}, C = \frac{1}{2}, D = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow y(x) = L^{-1}\left\{-\frac{1}{s} + \frac{\frac{1}{2}}{s-1} + \frac{\frac{1}{2}s - \frac{1}{2}}{s^2+1}\right\}$$

$$\Rightarrow y(x) = -1 + \frac{1}{2}e^x + \frac{1}{2}\cos x - \frac{1}{2}\sin x$$

çözümü bulunur.

(17)

ÖRNEK : $y'' - 3y' + 2y = e^{-x}$ denlemi ni çözü m ü z.

Çözüm : Başlangıç koşulları verilmemiştir. Laplace d e n e m i ni kullanırız.

$$\mathcal{L}\{y''\} - 3\mathcal{L}\{y'\} + 2\mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{e^{-x}\}$$

$$\Rightarrow [s^2 Y(s) - s c_0 - c_1] - 3[sY(s) - c_0] + 2[Y(s)] = \frac{1}{s+1}$$

yanılabılır. Burada c_0 ve c_1 sabitleri $y(0)$ ve $y'(0)$ başlangıç koşullarını temsil ettiğinden keyfi sabit olarak kalırlar. 0 h a d e

$$Y(s) = c_0 \cdot \frac{s-3}{s^2-3s+2} + c_1 \frac{1}{s^2-3s+2} + \frac{1}{(s+1)(s^2-3s+2)}$$

bulunur. Basit kesirlere ayırma metoduylla

$$y(x) = c_0 \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{s-1} + \frac{-1}{s-2} \right\} + c_1 \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{-1}{s-1} + \frac{1}{s-2} \right\} + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\frac{1}{6}}{s+1} + \frac{-\frac{1}{2}}{s-1} + \frac{\frac{1}{3}}{s-2} \right\}$$

$$\Rightarrow y(x) = c_0 (2e^x - e^{2x}) + c_1 (-e^x + e^{2x}) + \left(\frac{1}{6} e^{-x} - \frac{1}{2} e^x + \frac{1}{3} e^{2x} \right)$$

$$\Rightarrow y(x) = (2c_0 - c_1 - \frac{1}{2}) e^x + (-c_0 + c_1 + \frac{1}{3}) e^{2x} + \frac{1}{6} e^{-x}$$

$$\Rightarrow y(x) = d_0 e^x + d_1 e^{2x} + \frac{1}{6} e^{-x}$$

çözümü bulunur.

**ALL
ONE**